



Adparapropa gabrieli n.sp.: Fig. 11 - macho, holótipo; Fig. 12 - vésica do edeago; Fig. 13 - parâmetro esquerdo; Fig. 14 - parâmetro direito.

Adparapropa itatiaiana n.sp.
(Figs 15-18)

Caracterizada pela coloração do hemiélitro e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 4,4 mm, largura 1,2 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vértice 0,28 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,6 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,6 mm. **Pronato:** comprimento 0,5 mm, largura na base 1,0 mm. **Cúneo:** comprimento 0,80 mm, largura na base 0,36 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-suja com áreas negras a castanho-escuras; cabeça e segmento I da antena pálido-sujos, segmentos II-IV e olhos pretos; pronoto pálido-sujo, mais claro na margem posterior, preto na área dos calos e margens laterais; mesoes-cuto e escutelo pretos, mancha apical neste último pálida; hemiélitro pálido-sujo, clavo na base interna preto, restante e duas faixas transversais no cório (ao nível do ápice do clavo), contíguas junto a comissura corial castanho-escuras, margem interna do embólio negra, região apical e margem interna apical do cúneo, membranas fuscas, nervuras negras.