

o presente e a inclusão de outras ainda novas para a ciência.

Nesse gênero a coloração geral mostra-se bastante variável, mas mesmo assim permite a diagnose das espécies. A genitália mostra padrão genérico, sendo os parâmeros bons indicadores específicos. O pênis, muito pequeno e de difícil estudo, também revela bons caracteres diferenciais.

Apesar do trabalho referir-se a espécies sul-americanas o autor julgou de bom proveito a revisão do lectótipo da espécie *Falconia poetica* Distant, 1884, Guatemala.

Os desenhos que figuram no texto são de autoria de Paulo Roberto Nascimento e Maria Lilia Gomide da Silva, sob a supervisão do autor.

*Falconia* Distant, 1884  
*Falconia Distant*, 1884:298.

Orthotylinæ, Orthotylini. Corpo alongado, fortemente pontuado (mesmo na cabeça, cúneo e mesoesterno), pubescência curta e semi-erecta.

Cabeça vertical, mais larga que longa, vértice marginado, reto posteriormente, fronte redonda, olhos contíguos ao pronoto; antena cilíndrica, segmentos de comprimento variável, segmento I levemente mais engrossado sub-basalmente em algumas espécies, pêlos de comprimento aproximadamente igual à grossura dos segmentos; rostró curto, alcançando do ápice das coxas I à base das coxas II.

Pronoto em geral visivelmente estreitado no meio, calos grandes, colar deprimido, margem posterior muito levemente convexa, ângulos posteriores arredondados; mesoescuto geralmente encoberto, escutelo plano.

Hemiélitro visivelmente inclinado para baixo na porção basal do lado externo na nervura radial, cúneo de tamanho variável, fratura cuneal variando de horizontal a oblíqua; membrana de comprimento variável, aréola arredondada apicalmente.

Espécie-tipo do gênero: *Falconia poetica* Distant, 1884

Gênero bastante semelhante a *Falconiodes* Reuter, 1905 do qual difere por possuir os lados do corpo menos arredondados e olhos contíguos ao pronoto.

CHAVE PARA IDENTIFICAÇÃO  
 DAS ESPÉCIES SUL-AMERICANAS  
 DO GÊNERO *FALCONIA*

- 1. Ambos os sexos de coloração superior do corpo preta, uniforme . . . . . 2
- Pelo menos um dos sexos com corpo tendo áreas pálido-amareladas ou lutescentes superiormente . . . . . 3
- 2. Corpo fortemente estreitado no pronoto; segmento II da antena de comprimento igual a lar-

- gura da cabeça . . . . .
- . . . . . *BALLOUI* (Knight e Carvalho)
- Corpo não estreitado no pronoto; segmento II da antena mais longo que a largura da cabeça . . . . . *NIGRA* n.sp.
- 3. Espécie de pequeno porte (macho abaixo de 3,0 mm de comprimento); segmento I da antena mais curto que a largura do vértice, segmento II da largura da cabeça . . . . . *MINOR* Carvalho
- Espécies de porte maior (machos acima de 3,0 mm de comprimento); segmento I da antena igual ou maior que a largura no vértice, segmento II mais longo que a largura na cabeça . . . . . 4
- 4. Espécies de coloração predominante pálido-amarelada; pronoto fortemente constricto no meio; antenas geralmente pálidas em sua maior extensão . . . . . 5
- Espécies geralmente com coloração negra no clavo; antenas negras em sua maior extensão . . . . . 6
- 5. Manchas ao lado da comissura corial separadas e bem nítidas; rostró curto, alcançando apenas o ápice das coxas I . . . . . *PARAUARA* n.sp.
- Mancha da comissura corial única; rostró alcançando o meio do mesoesterno . . . . .
- . . . . . *TUPIANA* Carvalho
- 6. Cúneo totalmente negro ou com ápice ou margem interna negros em exemplares machos ou de ambos os sexos . . . . . 7
- Cúneo totalmente pálido-amarelado em toda sua extensão nos machos . . . . . 9
- 7. Espécie de coloração negra com duas manchas lutescentes no pronoto; segmento I da antena aproximadamente igual à largura da cabeça . . . . . *SCHAFFNERI* n.sp.
- Espécies, quando negras, sem as manchas mencionadas acima; segmento I da antena mais curto que a largura da cabeça . . . . . 8
- 8. Cor predominantemente negra; região posterior da cabeça e área posterior do disco com predominância de cor negra . . . . .
- . . . . . *ANTIOQUIANA* n.sp.
- Cor predominantemente pálido-amarelada; região posterior da cabeça e área posterior do disco notadamente mais claros . . . . .
- . . . . . *INCAICA* n.sp.
- 9. Espécie de corpo muito alongado; segmento I da antena cerca de duas vezes mais longo que a largura da cabeça; fêmur III com mancha escura subapical . . . . . *CALLANGANA* n.sp.
- Espécies quando alongadas, com segmento I da antena de comprimento igual ou apenas pouco mais longo que a largura do vértice; fêmur sem a mancha acima . . . . . 10
- 10. Pronoto, escutelo e clavo pretos . . . . . 11
- Pronoto, escutelo e clavo pálidos ou parcial ou