

длина ♂ 7.8—8.7, ♀ 7.5—8.6 мм; наибольшая ширина ♂ 1.9—2.2, ♀ 2.1—2.3 мм; ширина переднеспинки: ♂ 1.5—1.65, ♀ 1.55—1.8 мм.

Джунгарский Алатау, окр. с. Тополевки, 40 км вост. Сарканды, 18—26 VI 1957 (И. Кержнер и В. Кузнецов), 19 ♂♂, 16 ♀♀ (голотип — ♂ и аллотип — ♀ собраны 18 VI, остальные экземпляры — паратипы); Карапал, 19 VI 1926 (Ф. Добржанский и Ю. Керкис), 1 ♂, 1 ♀. 18 ♂♂ и 16 ♀♀ собраны в яблоневом лесу на высоте 1300 м на соцветиях *Dictamnus angustifolius* G. Don. и единично поблизости на цветках *Geranium* и других растений. 20 VI 1 ♂ прилетел на свет в ущелье р. Биесимас, где также растет *Dictamnus*.

PHYTOCORIS FALL.

✓ *Phytocoris (Ktenocoris) triodontus* Kerzhner, sp. n.

♂♂ полнокрылые, продолговатые, ♀♀ короткокрылые, тело их удлиненоовальное, расширяющееся кзади. Окраска грязновато-беловатая, с расплывчатым черным или буро-черным рисунком, в целом насекомые выглядят темными буровато-серыми. Верх тела покрыт короткими, серебристо-белыми и черными волосками почти равной длины, на голове только светлые волоски.

♂. Голова светлая, с мелкими буроватыми и черными пятнами и полосками. От основания наличника к глазу идет черная линия, продолжающаяся затем до заднего края переднегруди. 1-й членник усиков черный, в мелких, белых пятнах; покрыт щетинками, длина которых почти равна толщине членника; 2-й членник в основной четверти белый, дальше до середины буроватый, в вершинной половине желтый, причем вершинная четверть несколько темнее, иногда буроватая; 3-й членник однотонный, светло-желтый; 4-й членник буроватый. Хоботок далеко заходит за задние тазики. Переднеспинка светлая, с мелкими, бурыми или черными пятнышками; боковые края ее и полоса вдоль заднего края размытые, черные; узкая полоска по заднему краю белая; посередине переднеспинки очень неясная, часто почти незаметная, продольная, светлая линия. Щиток на светлом фоне с продольной, черной полоской и широкими, часто прерванными, черными, поперечными полосами в основании и на вершине. Надкрылья в густой, буро-черной пестрине; внутренний край клавуса, косая полоса вдоль кориума и кунеус, кроме самой вершины, сравнительно светлее; в заднем углу клавуса, задних углах кориума, на вершине и по середине внутреннего края кунеуса небольшие, черные пятнышки со сгущениями черных волосков. Перепоночка в мелких, темных пятнышках, кубитальная жилка светлая, с немногими темными точками. Бедра черные или темно-бурые, с белыми пятнышками, задние бедра белые в основной трети и на самой вершине, близ вершины с косой, белой полоской, иногда прерванной. Голени светлые с перечисленными ниже темными кольцами: передние с незамкнутым кольцом близ основания, узкими кольцами на вершинах 1-й и 2-й четвертей от основания и широким кольцом на самой вершине; средние узко затемнены в основании и на вершине и, кроме того, еще с 3 узкими, темными кольцами; задние с 2 сближенными или сливающимися, широкими, прерывистыми кольцами в основании и узкими кольцами близ середины и ближе к вершине. 1-е и 3-е членники лапок на всех ногах затемнены. Низ светлый, с темными пятнами и линиями, голова иногда снизу зеленоватая. Генитальный сегмент на спинной стороне с 2 бугорками по краю генитального отверстия (рис. 19, 20).