

Темя шире глаза у ♂ в 1.1—1.3, у ♀ в 2.0—2.7 раза. Затылок желтоватый. Усики буровато-желтые; 1-й членик и основание 2-го иногда темно-бурые; 2-й членик у ♂ несколько длиннее ширины переднеспинки в основании, у ♀ короче или равен ей. Соотношение длин члеников усиков (начиная с 1-го) — у ♂ 10 : 45 : 30 : 15, у ♀ 9 : 33 : 20 : 14. Хоботок слегка заходит за задние тазики. Основание щитка целиком или отчасти оранжевое. Корнум и клавус одноцветные, светло-бурые, иногда почти сероватые, в негустых, часто плохо заметных, округлых, темно-бурых пятнышках (рис. 65). Кунеус лишь вдоль самого основания узко беловатый, в остальной части окрашен как корнум и клавус, с очень немногими бурыми пятнышками, преимущественно вдоль внутреннего края. При определенном освещении надкрылий заметны еще густые и очень мелкие, черные точки, вероятно основания волосков, на кунеусе и корнуме. Перепончка дымчато-серая, с изменчивым, светлым рисунком; жилки ее оранжевые. У мелких экземпляров, особенно у ♀♀, бурые пятнышки на всем теле лучше заметны, жилки перепонки обычно белые. Изредка кунеус вдоль перепонки слегка красноватый. Ноги желтоватые; бедра с бурыми пятнышками; голени с черными шипиками; коготки лапок узкие, слабо изогнутые. Гениталии ♂.




Рис. 37—40. *Orthotylus oschanini* Reut., ♂ (Тополевка).

Рис. 37. Эдеагус. Рис. 38. Вершина левого параметра. Рис. 39. Левый параметр, вид сбоку, схематично. Рис. 40. Правый параметр, вид изнутри.

Генитальный сегмент снизу с продольным килем. Правый параметр (рис. 42) узкий, длинный. Левый параметр (рис. 43, 44) высокий (см. сбоку) и широкий (см. сверху), зубец на чувствительном бугорке с черной щетинкой. Тека (рис. 41) узкая, длинная. Эдеагус (рис. 45, 46) на вершине с одним длинным, слабо изогнутым отростком. Общая длина ♂ 3.5—4.4, ♀ 3.35—3.75 мм; ширина переднеспинки сзади ♂ 0.92—1.05, ♀ 0.8—0.88 мм. Экземпляры из Таласского Алатау мельче остальных.

Голотип — ♂ и аллотип — ♀: Запийский Алатау, ущелье р. Б. Алматинки, 24 VIII 1938 (В. Шнитников); паратипы: Таласский Алатау, р. Кара-Чай, 1 VIII 1930 (Л. Бианки), 1 ♂, слияние рр. Кара-Чай и Беш-Таш, 31 VIII 1930 (Л. Бианки), 16 экз.; Запийский Алатау, ущелье р. Б. Алматинки, 29 VII—24 VIII 1938 (В. Шнитников), свыше 100 экз.; Джунгарский Алатау, окр. с. Тополевки, вост. Сарканда, 3 и 9 VII 1957 (И. Кержнер), 8 экз. В Джунгарском и Запийском Алатау собран на ели Шренка (*Picea schrenkiana* Fisch. et Mey.). Встречается на высотах от 1100 до 2400 м.

Хорошо отличается от других видов рода окраской, характером и размещением бурых пятнышек и строением гениталий ♂.

### *Coniortodes kiritschenkoi* Kerzhner, sp. n.

*Psallus ignitus* (nom. nud.), Кириченко, 1951: 194.

Продолговатый (♂) или продолговатоовальный (♀); окраска в целом от ярко-красной до светло-буровато-желтой, сверху покрыт серебристо-белыми и черными волосками. Голова желтоватая, с рисунком из красных