

сверху). Эдеагус (рис. 51, 52) на вершине с одним отростком, дающим близ вершины короткую боковую ветвь. Длина тела ♂ 3.8—4.2, ♀ 3.2—3.4 мм; ширина переднеспинки сзади ♂, ♀ 0.95—1.05 мм.

Киргизия, Ферганский хр., Гава и ур. Ак-Терек сев. Гавы, 21 VII—25 VIII 1937 (А. Кириченко), 14 ♂♂, 14 ♀♀ (голотип — ♂ и аллотип — ♀ собраны 9 VIII, остальные экземпляры — паратипы); Кенкол-Сай, 8 VIII 1958 (Ю. Попов), 1 ♂ (паратип). Указание для Кондары (Кириченко, 1951) ошибочно.

Новый вид близок к описанному выше *C. alatavicus* Kerzhner, sp. n., отличается от него окраской и строением эдеагуса. Известный из Средней Азии и Ирана *C. nebulosus* (Reut.) (рис. 59—64)

хорошо отличается от *C. kiritshenkoi* небольшими размерами и отсутствием четких, мелких, темных точек на надкрыльях, а также строением гениталий ♂.




Рис. 65—67. Вершины надкрылий.

Рис. 65. *Coniortodes alatavicus* Kerzhner, sp. n., ♂. Рис. 66. *C. kiritshenkoi* Kerzhner, sp. n., ♂. Рис. 67. *C. nebulosus* (Reut.), ♂.

#### CHLAMYDATUS CURT.

EUATTUS Kerzhner, nom. n.

*Attus* Hahn (nom. praecuscat.).

Название *Attus* Hahn, 1832 преокупировано *Attus* Walckenaer, 1805

(*Arachnoidea*) и не может употребляться ни как родовое, ни как подродовое (Wagner, 1952) название.

Подрод характеризуется блестящей, черной окраской тела и надкрылий, желтыми, с черными точками ногами и всегда развитыми надкрыльями, прикрывающими по крайней мере брюшко. Из палеарктических видов к подроду относятся *Chlamydatus pulicarius* Fall. (тип подрода), *Ch. pullus* Reut., *Ch. fulvicornis* Jak., *Ch. longirostris* Reut. и *Ch. eurotiae* Kerzhner, sp. n. Описанный в 1959 г. *Ch. allii* Putsh. должен быть включен в подрод *Eurymerocoris* Kbm.

#### *Chlamydatus* (*Euattus*) *eurotiae* Kerzhner, sp. n.

Мелкий, продолговатоовальный, сильно блестящий, черный, усики и ноги отчасти желтые. Сверху густо покрыт белыми, слегка золотистыми волосками, длина которых в 2.5—3 раза больше толщины 2-го членика усиков. Голова сильно наклоненная, по заднему краю заметно скошенная назад. Лоб выпуклый. Темя с заметным килем, у ♂ в 2.6—2.65, у ♀ в 3 раза шире глаза (измерения перпендикулярно сверху). Усики светло-желтые; 1-й членик их и самое основание 2-го передко буровато-желтые или бурые, иногда (у некоторых ♂♂) 1-й и 2-й членики темно-бурые или почти черные, а 2 последних членика буроватые; 2-й членик усиков не утолщенный, в 12—14 раз длиннее своей толщины, в 1.3—1.5 раза короче ширины головы с глазами и в 1.8—2 раза короче ширины переднеспинки сзади. Соотношение длин члеников усиков (начиная с 1-го) — у ♂ 1 : 2.7 : 1.8 : : 1.4, ♀ 1 : 2.5 : 1.75 : 1.4. Хоботок доходит до заднего края задних тазиков. Ширина переднеспинки сзади в 2.5 раза больше ее длины посере-