

имѣть еще рѣзкія поперечныя морщинки; простые глазки у него широко разставлены, а у *S. littoralis* почти слитныя.

Найденъ М. М. Нѣмчиновой на берегу Зеи, у Зейской пристани.

25. *Ectemnus magnicornis* n. sp. — Körper schwarz. Kopf doppelt länger als breit, oben zerstreut abstehend behaart. Fühler schwarz, ihr 3-tes Glied weisslich, ihr 2-tes Glied sehr dick, spindelförmig, fast so lang wie der Kopf, ganz abstehend lang behaart. Halbdecken abgekürzt, schwärzlich, Corium-Grund weisslich. Beine schwarz, Schienenbeine und Füsse bleich rostgelblich. — Lg. $2\frac{3}{4}$ mm.

Taurien, Fluss Alma (G. Rybakow), 1 Exemplar.

Чернаго цвѣта, слабо блестящій. Голова вдвое длиннѣ своей ширины, покрытая сверху рѣдкими стоячими волосками, съ усиками оригинальной формы, чернаго цвѣта (кромя 3-го сустава, который весь бѣловатый); 1-й суставъ усиковъ далеко не достигаетъ конца носа, 2-й въ длину едва короче головы, очень толстый, веретенообразной формы и покрытый длинными стоячими волосками чернаго цвѣта, 3-й весьма короткій и 4-й нѣсколько длиннѣ его. Задняя часть переднеспиньи очень мелко шагринирована. Надкрылья укороченныя, черноватыя, внѣшняя часть corium'a у основанія съ широкой бѣловатой полоской, идущей вдоль clavus'a. Ноги чернаго цвѣта, голени и лапки блѣднорыжеватыя, изъ нихъ первыя у основанія и на концѣ буроватыя.

Одинъ экземпляръ найденъ Г. Г. Рыбаковымъ въ Крыму.

26. *Capsus ater* n. sp. — Schwarz, Oberseite weitläufig grob punktirt. Kopf länger als breit, Querfleck im Nacken rostgelb. Fühler sehr lang, bräunlich behaart, ihr Wurzelglied so lang wie der Kopf und viel länger als Hinterrand des Pronotums, ihr 2-tes Glied etwas über dreimal länger als das 1-te, nach oben allmählig verdickt. Schnabel schwarzbraun, Wurzelglied oben rostgelblich. Schild gewölbt, breiter als lang, ganz punktirt und quengerunzelt. Cuneus-Grund aussen weisslich. Unten