

schwarz, Stinkdrüsen-Oeffnungen weiss. Beine schwarz, Schienbeine rostgelblich, am Grunde und am Ende braungeringelt. Schienbeine und Füsse rostgelb behaart und bewimpert. — Lg. $7\frac{1}{2}$ —8 mm.—Irkutsk. Selten.

Все туловище, надкрылья и конечности черного цвѣта; поверхность тѣла (кромя головы) покрыта крупными, глубокими, широкоразставленными точками. Голова болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширину, широкое поперечное пятно на затылкѣ рыжеватое. Усики очень длинныя, 1-й суставъ ихъ одинаковой длины съ головой и выдается на половину далѣе ея впередъ, а 2-й въ $2\frac{1}{2}$ раза длиннѣе 1-го и значительно длиннѣе задняго края переднеспинки, постепенно утолщающійся къ вершинѣ; первые два сустава черного цвѣта, послѣдніе блѣднорыжеватыя, основаніе 3-го сустава бѣловатое; всѣ они покрыты довольно длинными прилегающими волосками, буроватыми на первыхъ суставахъ и болѣе свѣтлыми на послѣднихъ. Хоботокъ темнобурый, почти черный, первый суставъ его сверху рыжеватый. Щитокъ выпуклый, болѣе развитый въ ширину, весь покрытый пунктиромъ и поперечными морщинами. Синеус черного цвѣта, слабо пунктированный, съ бѣловатымъ пятномъ на внѣшнемъ переднемъ углѣ. Перепонка дымчатобурая, съ бѣлымъ пятномъ въ основаніи внѣшняго угла, съ сильными темнобурими ребрами. Нижняя сторона туловища вся черная, только устьица отдѣлительныхъ железъ бѣлыя. Ноги черныя, концы бедръ и голени блѣднорыжеватыя; широкое кольцо въ основаніи голеней и вершины ихъ бурья. Голени и лапки покрыты рыжеватыми волосками и щетинками.

Очень похожъ на *C. scutellaris* var. *morio*, но отличается большей величиной, весьма крупными и рѣдкими точками пунктира, удлиненой головой и пунктированнымъ щитикомъ; у var. *morio* пунктиръ мельче и гораздо гуще, голова болѣе развитая въ ширину и щитокъ совершенно гладкій.

Изрѣдка встрѣчается въ окрестностяхъ Иркутска.
27. *Capsus quadrimaculatus* n. sp. — Schwarz, glän-