

zend grob punktirt, Kopf und Schild glatt. Kopf im Nacken mit einer gelblichen Querlinie. Fühler schwarz, ihr 3-tes und 4-tes Glied bräunlich (3-tes Glied am Grunde weisslich), Wurzelglied dünn und viel kürzer als der Kopf, 2-tes Glied viermal länger als das 1-te, spindelförmig, dicht lang schwarzbehaart. Schild sehr gewölbt. Halbdecken schwarz, ein Grundfleck und Cuneus roth, Cuneus-Spitze schwarz. Schienbeine breit weisslich geringelt. — Lg. 6—7 mm.

Transcaucasien, Azkhur (H. Christoph), einige Exemplare.

Чернаго цвѣта, блестящій, довольно выпуклый, съ поверхностью грубо пунктированной (кромѣ головы и щитка, которые совершенно гладкіе). Голова небольшая, съ очень выпуклыми глазами, высокимъ рубчикомъ поперекъ затылка и желтоватой поперечной полоской впереди рубчика. Усики черные, основаніе 3-го сустава бѣловатое, послѣдніе два сустава буроватые; основной суставъ тонкій, гораздо короче головы, а 2-й постепенно утолщающійся къ вершинѣ, веретенообразной формы, густо одѣтый черными, довольно длинными, прилегающими волосками, четверо длиннѣе основнаго сустава; 3-й едва длиннѣе 1-го и замѣтно длиннѣе 4-го, оба послѣдніе сустава тонкіе, нитевидные, очень густо одѣтые короткими шелковистыми волосками. Хоботокъ весь черный. Щитокъ очень выпуклый. Надкрылья черныя, большое пятно въ основаніи ихъ, захватывающее также *clavus*, и клиновидная часть (*cuneus*), кромѣ конца, красныя. Ноги черныя, на каждой голени по два широкихъ бѣловатыхъ кольца. Нижняя сторона туловища черная, переднегрудь по бокамъ и устьяца отдѣлительныхъ железъ бѣлыя.

Найденъ Г. О. Кристофомъ въ Ацхурѣ.

28. *Capsus nebulosus* n. sp. — Körper lang gestreckt, schwarz. Kopf viel länger als breit, glänzend schwarz, mit dreieckigem gelben Fleck im Nacken; Fühler schwarz, dicht braun behaart, ihr 2-tes Glied stabförmig; Schnabel auf die Hinterhüften reichend. Halsschild vorn stark verengt, so lang als breit, dicht und ziemlich grob punktirt, schwarz, Hinterrand