

Единственный экземпляр найденъ на юго-западномъ берегу Байкала, въ окрестностяхъ села Култука.

29. *Agallastes fulvicornis* n. sp. — Schwarz, fein runzelig punktirt und graugelb behaart. Kopf glänzend glatt, Nacken mit gelber kielförmiger Querleiste und durchlaufender Mittelfurche. Fühler rostgelb, ihr 2-tes Glied am Grunde und am Ende braun geringelt, so lang als Kopf im Nacken und fast so lang, wie das 3-te und das 4-te zusammen genommen. Schnabel bräunlich, auf die Mittelhüften reichend. Membran vollständig, rauchbraun. Schenkel schwarz, Schienbeine rostgelb, schwarz punktirt und lang bedornt. — Lg. $2\frac{1}{2}$ mm.

Nördl. Mongolien, zwischen den Flüssen «Chara» und «Boro». (G. Potanin).

Черный, полублестящій, покрытый нѣжными пепельножелтыми волосками. Голова гладкая, блестящая съ продольной бороздкой на затылкѣ; поперечный затылочный рубчикъ очень высокій, яркерыжій; усики яркерыжіе, 2-й суставъ ихъ у основанія и на вершинѣ съ буроватыми кольцами; этотъ суставъ одинаковой длины съ шириной затылка и почти равенъ двумъ послѣднимъ суставамъ, вмѣстѣ взятымъ. Хоботокъ буроватый, достигающій до второй пары ногъ. Переднеспинка въ передней своей части покрыта мельчайшимъ пунктиромъ, въ задней же и на щиткѣ — весьма нѣжными поперечными морщинками. Перепонка полная, свѣтлодымчатая, ребра ея влѣтокъ буроватыя. Бедра черныя, вершины ихъ, голени и лапы рыжія; голени заднихъ двухъ паръ покрыты черными пятнами и длинными щетинками.

Отъ *Ag. publicarius* отличается однообразнымъ цвѣтомъ усиковъ, бороздкой на затылкѣ и болѣе длинной переднеспинкой, а отъ *Ag. Wilkinsoni* D.-S. — присутствіемъ черныхъ пятенъ на голеняхъ.

Найденъ Г. Н. Потанинымъ въ Сѣверной Монголіи, между рѣками Хара и Боро.

