

КЪ ФАУНЪ ПОЛУЖЕСТВОКРЫЛЫХЪ России и сопѣднихъ странъ.

(Zur Hemipteren-Fauna Russlands und der angrenzenden Lander).

Von **B. E. Jakowleff**.

1. *Psacasta transcasica* n. sp. — Körper oval, mit parallelen Seiten, bleich röthlichbraun; Oberseite dicht schwarz oder braun, stellenweise — farblos punctirt und zerstreut weisslich gehöckert. Kopf dick, braunroth, mit weisslicher Mittellinie; Wangenplatten unbewehrt; Fühler rothbraun, ihr 3-tes Glied halb so lang wie das 2-te. Seitenrand des Halsschildes kielförmig, weisslich, gerade, mit kaum deutlichen Einschnitten; Schulterecke breitabgerundet, ohne Ausschnitt. Unterseite weisslich, grob schwarz punktirt und marmorirt. Connexivum in jedem Baucheinschritte mit 2 callosen Knoten am Grunde und an der Ecke. — Lg. $7\frac{1}{2}$ mm., lat. $4\frac{1}{2}$ mm.

Ass-chabad (A. Komarow), 1 Exemplar.

Видъ, близкий къ *Ps. exanthematica*, но отличающейся отъ всѣхъ другихъ двойными бугорками по наружному краю брюшка.

Туловище овальное, довольно вытянутое, съ параллельными боковыми сторонами, блѣднаго буроватаго цвѣта съ красноватымъ оттенкомъ, покрытое мѣстами чернымъ или бурымъ, мѣстами же безцвѣтнымъ пунктиромъ и между точками его —

довольно часто разбросанными бѣловатыми гладкими бугорками, болѣе всего развитыми на щиткѣ и на передней половинѣ переднеспинки. Голова большая, съ боковыми краями слабо-вогнутыми передъ довольно выпуклыми глазами и сближенными впереди скullовыми отростками; она — краснаго цвѣта, съ бѣлой продольной полоской посрединѣ. Скуловыя пластинки простыя, не вооруженные. Переднеспинка съ боковыми краями прямыми, килеватыми, бѣлаго цвѣта; плечевой угол широко-округленный, безъ вырѣзокъ на вершинѣ; передний край одинаковой ширины съ головой (взятой вмѣстѣ съ глазами). Усики рыжевато-бурые, 3-й суставъ ихъ на $\frac{1}{2}$ короче 2-го. Хоботокъ рыжеватый, послѣдніе два сустава его черные. Щитокъ такой же формы, какъ у *Ps. exanthematica*. Брюшко снизу (у ♀) довольно выпуклое, бѣловатое, съ крупными черными точками посрединѣ, образующими неправильный мраморный рисунокъ; широкіе боковые края темно-бурые, съ бѣловатыми бугорками дыхальцевъ; по наружному краю на каждомъ брюшномъ кольцѣ расположено по 2 бѣловатыхъ гладкихъ бугорка, по одному въ каждомъ углу.

Одинъ экземпляръ изъ окрестностей Асхабада, отъ А. В. Комарова.

Periphima, n. gen.

Körper oval, oben sehr gewölbt, kahl, sehr fein zerstreut punctirt. Kopf stark geneigt, so lang als breit; Stirnschwiele durchlaufend, Seitenrand vor den Augen sehr ausgeschweift, Wangenplatten vorn eckig vorstehend. Augen sehr klein. Fühler sehr dünn, Wurzelglied so lang als Glied 2 und 3 zusammen (2-tes Glied ist das kürzeste), Endglied so lang als Glieder 2, 3 und 4 zusammen. Halsschild querbreit, gewölbt, Vorderrand gerade abgestutzt, Seitenrand vorn tief ausgeschnitten, Halsecke stumpfspitzig, über die Augen ragend. Schild oval, kaum länger als der Rücken, in der Mitte kegelig erhoben; Pronotum und

Schild mit durchlaufendem Mittelkiele, Vordertheil des Pronotums und Schild am Grunde mit knotförmigen Vorsprüngen. Connexivum mit grossen Knoten; Bauch unten ziemlich gewölbt. Vorderbrust mit blattartigen Lappen. Beine kurz, glatt, kahl.

Туловище овальное, съ верхней стороны сильно (съ нижней — слабо)-выпуклое, безволосое, покрытое нѣжнымъ и не частымъ пунктиромъ. Голова сильно наклоненная книзу, почти вертикальная, одинаково развитая какъ въ длину, такъ и въ ширину, съ глазами весьма небольшими, узкими, поперечными; простые глазки сидятъ на высокихъ бугоркахъ и расположены въ одинаковомъ разстояніи какъ отъ сложныхъ глазъ, такъ и между собою; боковые края головы тотчасъ впереди глазъ образуютъ очень сильную вырѣзку, такъ что передняя часть головы вдвое уже затылочной; расширенная часть головы передъ глазами имѣеть видъ тупаго бугорка; скуловые отростки узкие, въ основаніи замѣтно выпуклые, напереди округленные и замѣтно короче носового валика; этотъ послѣдній довольно широкъ, параллеленъ, спереди сполна открыть и между глазами образуетъ высокій бугорокъ, который къ затылку постепенно понижается и около переднеспинки, вмѣстѣ съ затылкомъ, замѣтно вдавленъ. Усики тонкие, 1-й суставъ ихъ не толще прочихъ и по длини равенъ 2-му и 3-му, вмѣстѣ взятымъ; 2-й суставъ самый короткій, 3-й нѣсколько длиннѣе его и почти одинаковой длины съ 4-мъ, а 5-й — самый длинный и равенъ тремъ предыдущимъ, вмѣстѣ взятымъ. Скуловыя пластинки напереди въ видѣ сильнаго, широкаго зубца, постепенно спускающагося кзади. Переднеспинка имѣеть въ ширину вдвое болѣе, чѣмъ въ длину, весьма выпуклая, съ боковыми краями опущенными внизъ; передній край ея почти прямо обрѣзанъ, а боковой край въ передней части глубоко дугообразно вырѣзанъ, причемъ шейный уголъ значительно выдается впередъ, въ видѣ тупаго зубца, прилегающаго къ глазамъ; плечевая часть широко округленная, сзади вершины слегка вырѣзана и гораздо шире основанія надкрыльевъ; зад-

ний край переднеспинки почти прямой, ровный. Поверхность переднеспинки весьма неровная, на срединѣ глубоко впоперегъ вдавленная, а въ передней части съ высокими симметрическими бугорками; средній (самый развитой) бугорокъ — двойной, по сторонамъ его (сзади простыхъ глазковъ) помѣщается одна пара и еще далѣе (у внутреннихъ краевъ малозамѣтныхъ извилинъ) — другая пара отдельныхъ бугорковъ; по срединѣ переднеспинки идетъ продольное гладкое ребро, которое переходитъ и на щитокъ, гдѣ оно сильнѣе развито. Щитокъ овальный, на концѣ сбуживающійся, едва длиннѣе брюшка, съ слабой выемкой на вершинѣ и съ поверхностью весьма неровной; въ самомъ основаніи его, значительно отступя отъ основнаго угла, помѣщается высокій плоскій бугорокъ; нѣсколько сзади, по сторонамъ продольного ребра, находится вторая пара бугорковъ; посрединѣ же щитокъ поднимается высокимъ конусомъ, вершина котораго ограничена по перечнымъ ребромъ въ видѣ полукруга. Надкрылья съ боковыми краями прямymi, расширяющимися передъ самымъ основаніемъ, которое значительно съужено. Брюшко довольно замѣтно выдается изъ-подъ надкрыльевъ и по краямъ своимъ образуетъ весьма сильно развитые бугорки (по 5 съ каждой стороны), расположенные въ переднихъ углахъ брюшныхъ сегментовъ. Снизу брюшко довольно выпуклое. Передній край переднегруди съ выступающими впередъ широкими лопастями, которые имѣютъ глубокую выемку сзади глазъ и болѣе пологую — посрединѣ. Наружное отверстіе отдельительныхъ жезль едва замѣтное, въ видѣ длинной и весьма узкой щели. Ноги короткія, совершенно гладкія, безъ зубчиковъ и волосковъ, и только на концахъ голеней едва замѣтны короткіе шипики; наружная бороздка на голеняхъ едва явственная лишь передъ концомъ ихъ; 1-й суставъ задней пары лапокъ вдвое короче 3-го, а 2-й вдвое короче 1-го.

2. *P. Batesoni* n. sp. — Körper ganz gräulichgelb, stellenweise röthlich; Oberseite sehr fein zerstreut schwarz und

roth punktirt; Schildrand und Spitze gröber punktirt. Unterseite zerstreut röthlich punktirt, Bauchrand und Beine schwarz gefleckt. — Lg. 5 mm., lat. $3\frac{1}{2}$ mm.

Turkestan (Bateson), 3 Exemplare.

Туловище и конечности однообразнаго, весьма бледного съровато-желтаго цвета, местами съ красноватымъ оттенкомъ, зависящимъ отъ цвета пунктира; бугорки и ребра бледоватые. Наружная поверхность усына мельчайшими (но не частыми) черными или красноватыми точками не одинаковой силы; по краямъ щитка и, особенно, на вершинѣ его болѣе крупныя черные точки; кроме того, по бокамъ щитка замѣтны выпуклые бледоватыя морщинки. По краямъ брюшка, между выдающимися сильными бугорками, черные пятнышки. Нижняя сторона брюшка покрыта красноватыми рѣдкими точками. Ноги (кромѣ лапокъ) усыны сильными черными пятнами, болѣе крупными, чѣмъ на туловищѣ.

Три экземпляра этого оригинального вида были найдены въ Голодной степи (между Казалинскомъ и Каркалинскомъ) В. Бэйтсономъ и доставлены мнѣ чрезъ посредство П. П. и А. П. Семеновыхъ.

3. *Polyphima Koenigi* n. sp. — Breitoval, fast viereckig, lehmgelb, Oberseite sehr uneben. Kopf dreieckig, vorn verschmälernt, Stirnschwiele eingeschlossen, Wangenplatten gezahnt; Fühler sehr dünn, ihr 2-tes Glied gebogen, kürzer als Wurzelglied und etwas länger als das 3-te. Schnabel in das dritte Hüftpaar reichend. Halsschild sehr breit, Seitenränder ausgebreitet und abgerundet, Halsecke über die Augen ragend, Mittelrippe stark, vorn knotig. Halbdecken am Grunde eckig. Schild breitoval, in der Mitte dachförmig erhoben, stumpf kegelig; Längsrippe des Schildes stark, kielförmig. Bauch unten etwas gewölbt, zerstreut grob schwarz punktirt; Connexivum breit, querwulstig. Beine kurz, schwarz punktirt, Schienbeine an der oberen Kante ungleich gezahnt. — Lg. $8\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ mm., lat. $6\frac{1}{2}$ —7 mm.

Transkaspien (E. König), 3 Exemplare.

Туловище широкое, почти 4-угольное, глинисто-желтаго цвета, съ поверхностью весьма неровной, бугристой. Голова 3-угольная, съ носовымъ валикомъ выпуклымъ и совершенно закрытымъ скullовыми отростками; глаза очень небольшіе и, вслѣдствіе сильной вырѣзки головнаго края передъ самыми глазами, кажущіеся сидящими на ножѣ; скullовая пластинка съ сильными зубцами посрединѣ. Усики весьма тонкіе; 2-й изогнутый суставъ ихъ короче 1-го и нѣсколько длиннѣе 3-го, тогда какъ 4-й замѣтно длиннѣе 3-го, а пятый равенъ двумъ предпослѣднимъ, вмѣстѣ взятымъ. Хоботокъ достигаетъ задней пары ногъ. Переднеспинка весьма широкая, съ широкоокругленными боковыми сторонами, края которыхъ болѣе или менѣе неровные; шейный уголъ вытянутъ впередъ въ видѣ тупаго зубца, почти совершенно прикрывающаго глазъ; посрединѣ переднеспинки проходитъ весьма высокое ребро, которое въ передней части образуетъ сильный узель; по сторонамъ замѣтны два короткихъ ребра, не переходящихъ на заднюю ея часть, а поперегъ проходить глубокое и широкое вдавленіе; вся остальная поверхность покрыта сильными ребристыми морщинами и узлами весьма неправильной формы, въ углубленіяхъ между которыми изрѣдка разбросаны крупныя черныя точки; на плечевомъ углѣ замѣтна слабая вырѣзка. Переднегрудь съ выдающимися лопастями, имѣющими двойную вырѣзку. Надкрылья, расширенныя у основанія въ видѣ тупаго угла, глубоко вырѣзаны сзади этого выступа. Щитокъ широковальный, одинаковой длины съ брюшкомъ, имѣеть поверхность весьма неровную и посрединѣ поднимается въ видѣ тупаго конуса, круто спускающагося възади; посрединѣ во всю длину щитка идетъ сильное гладкое ребро, а въ основаніи замѣтно до 4 гладкихъ же продолговатыхъ бугорковъ; бока покрыты многими неправильной формы ребрами и узлами, между которыми разбросаны (и довольно рѣдко) крупныя черныя точки. Брюшко снизу нѣсколько выпуклое, покрытое рѣдкими же, но крупными черными точками; брюшной ободокъ

широкий, далеко выдающийся изъ-подъ надкрыльевъ и щитка, съ поперечными выпуклостями въ видѣ подушечекъ; наружный край ободка очень характерный, а именно: каждый сегментъ брюшка отдѣляется отъ другого глубокой вырѣзкой и, кромѣ того, край каждого сегмента имѣеть посрединѣ выемку (тотъ же характеръ ободка свойственъ и *P. scrobiculata* Jak., но вырѣзки его слабѣе выражены и болѣе округлены). Съ нижней стороны — голова, широкіе внѣшніе края груди и брюшной ободокъ чернаго цвѣта. Ноги толстые, короткія, покрыты черными пятнами; вѣнѣшній край голеней (особенно же у переднихъ паръ) неправильно зубчатый.

Все туловище и конечности обыкновенно густо покрыты слоемъ глины и песка, который отдѣляется лишь съ большимъ трудомъ.

Отъ другаго, свойственнаго Персіи, вида этого рода (*Polyphima scrobiculata* Jak.) описанный только-что видѣ уже съ первого взгляда отличается, кромѣ величины и болѣе грубой скульптуры, носовымъ валикомъ глубоко закрытымъ (у названного персидскаго вида валикъ этотъ совершенно свободный) и, кромѣ того, у *P. scrobiculata* поверхность покрыта мельчайшимъ черноватымъ пунктиромъ, нижня сторона туловища не имѣеть черной полосы по краямъ, сколько-вся пластинки безъ зубцовъ и основанія всѣхъ ногъ вооружены тупымъ высокимъ бугоркомъ.'

Три экземпляра были найдены Е. Г. Кенигомъ въ Закаспійской области (безъ болѣе точнаго обозначенія мѣстности).

4. *Phimodera collina* n. sp. — Körper oval, grau mit weisslicher und schwarzer Zeichnung. Kopf fast viereckig, Seitenränder in der Mitte bogig ausgeschweift; Augen gross; 2-tes Fühlerglied auf $\frac{1}{3}$ langer als das 3-te. Vorderrand des Halsschildes breiter als Kopf (mit Augen), Seitenrand vorn mit bogigem Ausschnitte, Halsecke rechtwinkelig. Längsrippe des Schildes glatt, weisslich. Bauch bleich bräunlich, dicht und tief schwarz punktirt. Beine schwarz, Schenkel am Grunde

gelb, vor der Ende gelbfleckt, Schienbeine mit breitem rost gelbem Halbring. — Lg. $5\frac{1}{2}$ —6 mm.

Irkutsk (nicht selten).

Видъ близкій къ *Ph. laevilinea* Stål отъ котораго отличается, главнымъ образомъ, формою головы, величиною глазъ и цвѣтомъ брюшка и ногъ.

Туловище овальное, съ боковыми краями почти прямыми у живыхъ экземпляровъ оно свѣтло-блѣдого цвѣта, мѣстами почти блѣло, съ бархатисто-чернымъ рисункомъ на переднеспинѣ и щитѣ (у сухихъ экземпляровъ свѣтлого цвѣта приобрѣтаютъ желтоватый оттѣнокъ). Голова почти 4-угольная, съ боковыми краями дугообразно вырѣзанными посерединѣ и со скелетными отростками, слегка и постепенно расширяющимися и округленными на концѣ. Глаза большие и почти вдвое крупнѣе, чѣмъ у *Ph. laevilinea*, а усики такой же формы, съ маленькимъ 3-мъ суставомъ, который на $\frac{1}{3}$ короче 2-го. Передній край переднеспинки шире головы ст. глазами; боковой край ея дугообразно вырѣзанъ передъ шейнымъ угломъ (этотъ уголъ — прямой). Вдоль переднеспинки и щитка проходитъ гладкое блѣдоватое ребро; боковые укороченные ребра щитка (и, вообще, весь рисунокъ на немъ выражены рельефнѣе и сильнѣе, чѣмъ у *Ph. laevilinea*. Боковые бугорки брюшка сильные, блѣдоватые; фонъ брюшка буроватый, проступающій между черными точками весьма густаго и глубокаго пунктира; послѣднее кольцо брюшка и генитальные части свѣтлобуроватыя. Ноги черного цвѣта; основанія и вершины бедръ, а также крупные пятна передъ вершиной рыжеватыя; иногда вся наружная часть бедръ покрыта такими болѣе или менѣе развитыми пятнами; голени съ рыжимъ полукольцомъ передъ вершиной.

Отъ описываемаго вида *Ph. laevilinea* отличается, кроме небольшихъ глазъ, еще слѣдующими признаками: боковые края головы, начиная отъ глазъ, прямые, сильно суживающіеся кпереди и на концѣ внезапно расширяющіеся въ полу-

круглую лопасть; боковая вырезка переднеспинки слабѣе и шейные углы вслѣдствіе того тупѣе, чѣмъ у *Ph. collina*; брюшко абсолютно чернаго цвѣта, съ слабо выдающимися бугорками по краямъ; бедра сполна чернаго цвѣта, кромѣ вершины, а голени имѣютъ рыжеватую полоску по наружному краю. Кромѣ того, *Ph. laevilinea* бываетъ, вообще, крупнѣе.

Phimodera collina встрѣчается нерѣдко въ окрестностяхъ Иркутска, по склонамъ горъ и холмовъ.

5. *Peribalus ovatus* n. sp.—Breitoval, röthlichbraun, unten bleichgelblich. Kopf gross, kaum langer als breit, Stirnschwiele und Nacken gewölbt; Augen gross. Fühler bleichgelblich, Glied 4 und 5 schwarz, am Grunde rostgelb; Glied 2 und 3 gleichlang. Halsschild dreimal breiter als lang; Seitenrand gerade, leicht ausgebreitet; Vorderrand bogig ausgeschweift. Schild kurz, gleichseitig; Schildgrund breiter als Kopf mit Augen. Connexivum mit schwarzen Querflecken. Bauch unten sehr fein zerstreut punktirt. Hinterschienbeine deutlich gekrümmmt. — Lg. 7 mm., lat. $4\frac{1}{2}$ mm.

Sibirien, Krasnojarsk (M. Kibort), 1 Exemplar.

Туловище короткое, широкоовальное, сверху красновато-бураго цвѣта, снизу блѣдное, желтоватое. Голова большая, едва длиннѣе своей ширины, съ замѣтно выпуклымъ затылкомъ и съ носовымъ валикомъ, закрытымъ скуловыми отростками; вся поверхность ея покрыта пунктиромъ, весьма мелкимъ и густымъ въ задней части и болѣе крупнымъ и разсѣяннымъ — въ передней ея части. Глаза большие. Усики довольно тонкие, 2-й и 3-й суставы ихъ равной длины; первые 3 сустава блѣдно-желтоватые, а послѣдніе — черные, съ рыжеватымъ основаніемъ; вершина 3-го сустава буроватая. Переднеспинка имѣетъ въ ширину втрое болѣе, чѣмъ въ длину; боковые края ея прямые, слегка расширенные, передній край дугообразно вырезанъ; плечевые углы узкие, округленные; вдоль килеватыхъ краевъ идѣтъ широкая черная полоса. Щитокъ короткий, равносторонній; основаніе его шире головы

(взятой съ глазами), вершина бѣловатая, весьма рѣдко пунктированная, съ черными полосками по бокамъ. Надкрылья у основания съ сильной вырезкой на вѣшнемъ краѣ. Брюшной ободокъ съ большими черными пятнами въ мѣстахъ соприкосновенія сегментовъ. Брюшко снизу покрыто очень мелкими и рѣдкими буроватыми и безцвѣтными точками. Ноги усыпаны мелкими черными точками, передъ вершиной бедръ замѣтны болѣе крупные черные пятна; концы голеней и лапки буроватые; задня голени замѣтно изогнуты.

Отличается отъ всѣхъ видовъ этого рода, кромѣ небольшаго роста и ширины туловища, формой головы, крупными глазами, прямыми, слегка даже округленными боковыми краями переднеспинки, широкимъ и короткимъ щиткомъ, слегка изогнутыми голенями и, наконецъ, цвѣтомъ и пунктировкой туловища.

Одинъ экземпляръ открытъ былъ въ окрестностяхъ Красноярска М. Е. Кибортомъ.

Mimula n. gen.

Körper flach gewölbt, lang behaart. Kopf platt, Jochstücke länger als die Stirnschwiele, Wangen so lang als der Kopf, nach unten allmälig verbreitet, lappig. Fühler stark, ihr 2-tes Glied etwas länger als das 3-te. Schnabel auf die erste Bauchschiene reichend, sein 2-tes Glied doppelt länger als das 1-te. Augen gross. Beine lang, ziemlich stark, dicht lang behaart.

Занимаетъ средину между родами *Agatharchus* и *Dolycoris*. Туловище сверху довольно плоское, снизу слабо выпуклое, покрытое (иногда только съ нижней стороны) длинными волосками. Голова плоская, большая; скуловые отростки длинные носового валика и иногда закрываютъ его; скуловыя пластинки во всю длину головы снизу взади постепенно расширяющіяся и оканчивающіяся округленною лопастью; пластинки эти развиты сильнѣе, чѣмъ у *Dolycoris*, но гораздо слабѣе, чѣмъ у

Agatharchus. Усики толстые, массивные чёмъ у обоихъ этихъ соседнихъ родовъ; 2-й суставъ ихъ нѣсколько длиннѣе 3-го. Хоботокъ длинный, достигающій до брюшка; 1-й суставъ его равенъ или едва короче головы, а 2-й вдвое длиннѣе 1-го. Глаза крупные. Ноги длинныя, довольно толстыя, весьма густо покрытыя длинными волосками. Остальные признаки какъ у рода *Dolycoris*.

6. *Mimula nigrita* n. sp. — Kopf langer als breit, mit geraden fast parallelen Seiten; Jochst cke gerade, vorn zuge rundet, Stirnschwiele durchlaufend. Pronotumsseiten gerade, etwas aufgeworfen. Oben kahl, dicht punktirt, schwarz; Kopf, Pronotum und Schild mit gelber durchlaufender Mittellinie; Seitenrand des Pronotums, ein Grundstreif am Coriumrande und der Hinterleibsrand gelb. F hler schwarz, fein weisslich behaart, Wurzelglied am Grunde gelblich. Schnabel schwarz, Glied 1 und 2 gelblich. Schildgrundwinkel mit gelblichem, callosen Flecken. Schienbeine und F sse schwarz, Schenkel bleich br unlich, dicht schwarz punktirt, am Ende schw rzlich. Unten ganz bleich br unlichgelb, lang weisslich behaart. — Lg. 11 $\frac{1}{2}$ mm.

Ferghana (F. Maurer), 1 Exemplar.

Сверху гладкій, безволосый, чернаго цвѣта; вдоль головы, переднеспинки и щитка проходитъ желтая полоска, расширяющаяся на концѣ щитка; боковыя окраины переднеспинки и основаній надкрыльевъ и брюшка гладкія, килеватыя, желтаго цвѣта. Снизу все туловище однообразнаго блѣднаго буровато-желтаго цвѣта и покрыто длинными бѣловатыми волосками, которые на брюшкѣ нѣсколько короче. Голова болѣе развита въ длину, съ боковыми краями почти прямymi, паралельными; скапловые отростки спереди округленные, прямые, оставляющіе носовой валикъ открытымъ. Усики чернаго цвѣта (но 1-й суставъ ихъ у основанія желтоватый) и покрыты короткими бѣловатыми волосками. Хоботокъ чернаго цвѣта и достигаетъ задней пары ногъ; 1-й суставъ его и боковыя стороны 2-го желтоватые. Переднеспинка съ боковыми краями

прямыми, слегка приподнятыми; шейный уголъ на вершинѣ съ зубчикомъ, а плечевой — округлennyй. Вся поверхность довольно густо и равнотренно пунктирована и на черномъ фонѣ ея просвѣчиваются блѣдныя точки. Въ основныхъ углахъ щитка — гладкій, желтоватый бугорокъ. Перепонка черноватая, нѣсколько длиннѣе брюшка. Брюшной ободокъ черный, съ узкой желтоватой окраиной. Голени и лапки черныя, бедра блѣдноватобурыя, покрыты многочисленными черными точками; вершина бедръ почти сплошь черноватая.

По виѣшности — и, въ особенности, по окраскѣ — *Mim. nigrita* очень напоминаетъ нѣкоторые виды рода *Agatharchus*, отъ которыхъ, уже съ первого взгляда, отличается волосистымъ покровомъ нижней стороны болѣе плоскаго туловища, болѣе нѣжнымъ пунктиромъ, свободнымъ носовымъ валикомъ и менѣе развитыми скелетовыми пластинками.

Одинъ экземпляръ найденъ былъ Ф. Ф. Мауреромъ въ Ферганской области.

7. *Mimula Maureri* n. sp. — Oben bleich bräunlich, unten blass schmutziggelb, ganz dicht lang weissbehaart. Kopf gestreckt, viel langer als breit, vor den Augen deutlich ausgeschnitten; Stirnchwiele eingeschlossen; Fühler stark, schwarz, ihr 2-tes Glied doppelt langer als das 1-te und kaum langer als das 3-te; Wurzelglied gelblich, aussen mit schwarzem Streif. Kopf schwarz, Mittelstreif, Kopfschild am Ende und ein Fleck an jedem Auge gelblich. Halsschild dicht runzelig punktirt, Mittelstreif und 2 kurze Streife beiderseits schwarz. Schulterecke zugespitzt. Schild runzelig punktirt, mit gelber durchlaufender Mittellinie. Connexivum und Beine blassgelb, Füsse braun. — Lg. 12 mm.

Фергана (F. Maurer).

Сверху блѣднобураго цвѣта, снизу все тѣло, таѣжъ какъ ноги и хоботокъ, свѣтлаго, грязноватожелтаго цвѣта. Какъ верхняя, такъ и нижняя сторона туловища густо одѣта бѣловаими волосками, болѣе длинными въ передней части тѣла и

на ногахъ; надкрылья почти безволосыя. Голова очень вытянутая, въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе своей ширины, съ боковыми краями замѣтно вогнутыми передъ глазами; скапловые отростки на переди округленные и почти сполна закрывающіе носовой валикъ. Усики толстые, длинные, чернаго цвѣта; 1-й суставъ ихъ желтоватый, съ черной полоской по вѣнчальному краю, а 2-й вдвое длиннѣе 1-го и едва длиннѣе 3-го. Хоботокъ достигаетъ до брюшка; онъ весь желтоватый, кромѣ конца послѣдняго сустава; скапловыя пластинки ровныя, изади возвышающіяся. Поверхность головы чернаго цвѣта, а продольная полоса по срединѣ, переднія окраины и пятна съ внутренней стороны глазъ — желтоватыя. Переднеспинка съ боковыми краями прямыми, слегка приподнятymi; шейный уголъ на вершинѣ съ острымъ зубчикомъ; плечевой уголъ, далеко выдающійся передъ надкрыльями, слегка пріостренный, съ замѣтной вырѣзкой назади; поверхность переднеспинки густо морщинисто-пунктирована, съ четырьмя черными полосками въ передней трети и съ цѣльной срединной полоской желтаго цвѣта. Щитокъ съ поверхностью довольно грубо-морщинисто пунктированной и съ продольной, нѣсколько выпуклой желтоватой полоской, расширяющейся на концѣ. Надкрылья слабо пунктированы и менѣе морщинисты, чѣмъ остьальная поверхность; перепонка длиннѣе брюшка, свѣтлобураго цвѣта, съ болѣе темнымъ основаниемъ. Брюшной ободокъ безъ пятенъ, такъ же какъ вся нижняя сторона туловища и ноги; лапки темнобурья.

Отъ предыдущаго этотъ видъ отличается цвѣтомъ, густымъ волосянымъ покровомъ поверхности, болѣе длинной головой съ закрытымъ носовымъ валикомъ и выдающимися, на вершинѣ пріостренными плечевыми углами.

Открытъ также г. Мауреромъ въ Ферганской области.

8. *Nezara breviceps* n. sp. — Breitoval, bleichgrünlich. Kopf viel breiter als lang, vorn abgerundet; Seitenrand fast gerade; Stirnschwiele eingeschlossen. Fühler dünn, bräunlich-grün, am Grunde bleichgelblich; ihr 2-tes Glied viel länger

als das 3-te und so lang als das Endglied. Bauch oben orange-gelb und bleichröhlich; Connexivum-Ecke jedes Segmentes mit schwarzem Punkt. Beine grünlich, Schienbeine am Grunde röhlich. — Lg. $8\frac{1}{2}$ mm., lat. 5 mm.

Transcaucasien, Station «Warwàra» (H. Christof).

Широкоovalной формы, блѣдноzelеноватаго цвѣта, съ слабымъ красноватымъ оттѣнкомъ. Головной щитокъ короткій, округлennyй, гораздо болѣе развитый въ ширину, съ боковыми краями почти прямymi; носовой валикъ закрытъ сводовыми отростками. Усики тонкіе, у основанія блѣдно желтоватые; послѣдніе суставы ихъ буроватозеленые; 2-й суставъ усиковъ гораздо длиннѣе 3-го и равенъ 5-му. Хоботокъ достигаетъ до конца груди. Переднеспинка съ боковыми сторонами прямymi, едва расширенными, съ узкимъ бѣловатымъ кантикомъ по наружному краю. Брюшко сверху яркооранжеваго цвѣта, снизу блѣднокрасноватое, съ черными точками въ заднихъ углахъ сегментовъ по вѣнчальному краю. Ноги зеленоватыя, съ красноватымъ основаниемъ голеней.

Описываемый видъ близокъ въ *N. Heegeri*, но короче и шире его; послѣдній отличается, кромѣ того, широкооткрытымъ носовымъ валикомъ, болѣе удлиненной головой, одинаково развитой какъ въ длину, такъ и въ ширину, 2-мъ и 3-мъ суставами усиковъ, имѣющими одинаковую длину, и зеленымъ цвѣтомъ верхней поверхности брюшка.

Видъ этотъ былъ найденъ Г. Ф. Кристофомъ въ окрестностяхъ станціи «Варвара», въ Закавказье.

9. *Capnoda Batesoni* n. sp. — Körper breitoval, etwas gewölbt, sehr fein und dicht punktirt und fein gelb behaart. Kopf sehr kurz, viel breiter als lang, stark geneigt; Stirn-schwiele durchlaufend, vorn allmälig verengt; Seitenränder kielförmig. Augen vorragend, fast halbkugelig. Fühler ziemlich lang, ihr 2-tes Glied etwas länger als das 1-te und auf $\frac{1}{3}$ kürzer als das 3-te. Schnabel an das Ende der Mittelbrust reichend. Halsschild querbreit, so lang als der Kopf, vorn

allmälig verrengt, Halsecke abgerundet; Seitenränder kielförmig. Schild viel länger als breit, am Grunde kaum schmäler als Kopf (mit Augen); Schildende stumpf abgerundet; in den Grundwinkeln ein calloser Knoten. In Farbe dem *Bagrada stolida* H.-S., ähnlich, gelb und schwarz, mit grünmetallischem Glanz. Kopf schwarz, Seitenkiele gelb; Fühler schwarz, ihr Wurzelglied (am Ende) und Glied 2 rostgelb. Halsschild schwarz, die Ränder und die Mittellinie gelb (die Mittellinie ist am Ende verbreitert). Schild gelb, in der Mitte schwarz, Halbdecken bleich, Membrannath schwärzlich. Hinterleib unten weisslich, mit 3 schwarzen Längsstreifen. Schenkel schwarz, Schienbeine und Füsse rostgelblich. — Lg. $4\frac{1}{2}$ mm.

Turkestan (W. Bateson), 1 Exemplar.

Туловище широкоовальное, слабо выпуклое, покрытое нѣжными желтоватыми волосками, мало замѣтными на головѣ и на передней части переднеспинки и весьма явственными на брюшкѣ (особенно же по бокамъ его). Голова весьма короткая (ея ширина болѣе чѣмъ въ $1\frac{1}{2}$ раза превышаетъ длину), очень круто, почти вертикально загнутая книзу, довольно выпуклая, съ тонкими, килеватыми боковыми краями; носовой валикъ открытый, въ видѣ длинного треугольника, постепенно суживающагося кпереди. Глаза выдающіеся, почти полушаровидной формы; простые глазки разставлены очень широко — вдвое далѣе другъ отъ друга, чѣмъ отъ сложныхъ глазъ. Вся поверхность головы весьма густо покрыта мельчайшимъ пунктиромъ, а передъ простыми глазками замѣтны неглубоко вдавленныя ямки. Усики довольно длинные; 1-й суставъ ихъ самый короткій, 2-й нѣсколько, длиниѣ 1-го и на $\frac{1}{3}$ короче 3-го, который почти одинаковой длины съ 4-мъ; послѣдній суставъ длиниѣ прочихъ; усики чернаго цвѣта, вершина 1-го и весь 2-й суставъ рыхеватые. Хоботокъ достигаетъ нѣсколько далѣе средней пары ногъ. Переднеспинка короткая (ея ширина въ $2\frac{1}{2}$ раза болѣе длины, одинаковой съ длиною головы); кпереди она постепенно суживается и имѣетъ округленные, опущенные книзу, киле-

ватые боковые края; передний край ея почти прямой, замѣтно шире головы (взятой вмѣстѣ съ глазами); вся поверхность переднеспинки покрыта мельчайшимъ пунктиромъ, весьма густымъ и болѣе нѣжнымъ въ передней ея трети и болѣе разрѣженнымъ къ заднему краю, который слегка вырѣзанъ передъ щиткомъ; плечевые углы выдающіеся, округленные. Щитокъ узкій, гораздо болѣе развитый въ длину; основаніе его едва уже головы, взятой съ глазами; вершина довольно тупая, округленная; посрединѣ проходитъ продольное ребро, тонкое, но довольно выпуклое и гладкое, вся же поверхность покрыта мельчайшимъ, разрѣженнымъ къ краямъ пунктиромъ; въ основаніи щитка два голыхъ выпуклыхъ бугорка. Надкрылья гораздо длиннѣе брюшка, съ перепонкой вполнѣ развитой. По цвѣторосписанію этотъ видъ напоминаетъ отчасти *Bagrada stolida* H.-S. Преобладающій цвѣтъ весьма блѣдный желтоватый, съ примѣсью чернаго, вездѣ отливающаго сильнымъ бронзовозеленымъ блескомъ. Голова вся черная, кроме тонкихъ килеватыхъ окраинъ; переднеспинка черная, широкія боковые края, весьма узкая оторочка по переднему и заднему краямъ и срединная продольная полоса — желтоватыя; эта послѣдняя полоса въ передней части почти линейная, а въ задней значительно расширяется и принимаетъ форму почти квадратную. Щитокъ только посрединѣ черный, широкія же боковыя окраины и вершина желтоватыя. Надкрылья свѣтлые, съ черной посерединѣ полоской надъ мембраннымъ швомъ; перепонка полупрозрачная съ темнобурыми ребрами. Тулowiще снизу блѣдоватое, съ широкой черной сплошной каймой по бокамъ, отъ которой по вѣнчному краю брюшного ободка остается только узкая желтоватая оторочка; посрединѣ брюшка идеть широкая черная продольная полоса, раздѣленная по самой срединѣ блѣдоватою линіею. Бедра черныя, голени и лапки ржеватыя.

Рѣзко отличается отъ *C. nigroaenea* Jak., распространенной въ той же области, какъ цвѣтомъ, такъ и формой головы

и переднеспинки, а равно болѣе укороченнымъ 2-мъ суставомъ усиковъ.

Одинъ экземпляръ этого вида былъ найденъ В. Бэтсономъ въ Голодной степи, между Казалинскомъ и Каркалинскомъ.

10. *Lygaeus Belogolowi* n. sp. — Körper lnglich, schmal, dicht und fein rostgelb behaart. Kopf ganz schwarz, Wangenplatten roth. Halsschild schmal, grob punktirt, roth, mit 2 viereckigen schwarzen Flecken; Mittelkiel und Seitenränder sehr stark gewölbt. Corium roth, in der Mitte mit schwarzem, rundem Fleck; Clavus schwarz, am Grunde und am Ende roth. Membran viel lnger als der Hinterleib, sehr schmal, sammtschwarz, weissgesäumt. Brust roth, mit 3 schwarzen Seitenflecken, Hinterleib und Connexivum roth, After schwarz, Bauchschienen mit querren schwarzen Bändern. Fhler, Beine und Schild schwarz. — Lg. $8\frac{1}{2}$ mm., lat. $2\frac{1}{2}$ mm.

China, Tian-zsin (Frau P. Belogolowaja).

Туловище яркокрасного цвѣта, густо покрытое нѣжными ржеватыми волосками. Голова вся черная, только скелетные пластинки красныя. Переднеспинка довольно узкая, съ очень выпуклыми, килеватыми боковыми краями и срединнымъ ребромъ; центральная части ея, по сторонамъ этого ребра, глубоко вдавлены впереди и довольно круто подняты назади, съ двумя большими, почти четырехъ-угольными пятнами; вся переднеспинка покрыта рѣдкимъ грубымъ пунктиромъ, который особенно выдается на черныхъ пятнахъ. Щитокъ съ продольнымъ ребромъ посерединѣ. Надкрылья цѣльныя, значительно длиннѣе брюшка; замковая часть ихъ (clavus) черная, но основаніе и конецъ ея красные; corium красный, посерединѣ съ небольшимъ кругловатымъ пятномъ чернаго цвѣта. Перепонка бархатисто-чернаго цвѣта, съ очень узкой бѣлой оторочкой. Средина груди и по три пятна съ каждой стороны ея чернаго цвѣта; постѣднее изъ этихъ пятенъ — небольшое. Брюшко снизу красное, безъ пятенъ на ободѣ; на первомъ брюшномъ кольцѣ два парныхъ черныхъ пятна.

по бокамъ, на остальныхъ кольцахъ проходятъ широкія, по-перечныя черныя полосы, которыя захватываютъ почти все кольцо, кромѣ узкаго задняго и болѣе широкаго бокового краевъ; послѣднее кольцо сплошна чернаго цвѣта.

Видъ близкій по окраскѣ къ *L. familiaris* F. и къ *L. marginatus* Jak. изъ Уссурійскаго края, но отличается узкой формой туловища, весьма длинными надкрыльями, имѣющими небольшое пятно посрединѣ, очень выпуклыми, толсто-килеватыми боковыми краями переднеспинки и поперечными черными полосами на кольцахъ брюшка, которая у приведенныхъ выше видовъ распадаются на отдѣльныя пятна.

Нѣсколько экземпляровъ этого вида было найдено П. А. Бѣлоголовой въ окрестностяхъ Тянъ-Цзина, въ Китаѣ.

11. *Arocatus fasciatus* n. sp. — Oben bräunlichgelb, unten röhlich, sehr fein goldgelb behaart. Kopf ziemlich gewölbt, viel breiter als lang, sehr fein runzelig punktirt, schwarz; Stirnchwiele und Jochstücke am Ende gelbroth. Fühler rostbräunlich, bisweilen ihr Glied 1 und 2 bräunlich. Schnabel rostgelb, an das Ende der Mittelbrust reichend. Halsschild etwas breiter als lang, sehr grob zerstreut punktirt, in der Mitte tief eingedrückt; Seitenrand fast gerade; Vorderrand und Schulterecke schwarz. Schild grob punktirt, schwarz, am Ende gelblich. Halbdecken bräunlich, Coriumgrund, eine breite Querbinde in der Mitte und Coriumspitze schwarz. Connexivum schwarz, mit weisslichen Flecken. Beine rostgelblich, Schenkel unterseits und Klauenglied schwärzlich — Lg. $5\frac{1}{2}$ mm.

Transbaicalien, Troizkossawsk. (G. Potanin).

Сверху буровато-желтаго цвѣта, снизу съ красноватымъ оттенкомъ, одѣтый мельчайшими золотисто-желтыми волосками. Голова довольно выпуклая, гораздо болѣе развитая въ ширину, весьма мелко морщинисто пунктированная, чернаго цвѣта; передняя часть ея (скулы и вершина носового валика) оранжево-краснаго цвѣта; простые глазки очень крупные. Усики такой же формы, какъ у *Ar. melanocephalus*, буроваторыжие, пер-

вые два сустава иногда болѣе темные. Хоботокъ рыжій, до-стигающій до заднегруди. Переднеспинка болѣе развитая въ ширину, съ боковыми краями почти прямymi, слегка выем-чатыми лишь посерединѣ, весьма сильно, разбросанно пунктиро-ванная, посерединѣ довольно глубоко вдавленная, съ тонкимъ продольнымъ ребромъ, исчезающимъ въ задней половинѣ; она буроватожелтаго или рыжеватаго цвѣта, передняя же окраина и плечевые углы черные. Щитокъ грубо пунктированный, чернаго цвѣта, съ желтоватой вершиной. Надкрылья буровато-желтыхъ, узкое основаніе ихъ, широкая поперечная полоса по-серединѣ, расположенная нѣсколько вѣось, и виѣшній уголъ на концѣ corium'a — чернаго цвѣта. Брюшко сверху и снизу рыжеватое, къ основанію постепенно темнѣющее; брюшной ободокъ черный, съ большими бѣловатыми пятнами. Ноги ры-жеватыя, бедра съ внутренней стороны и послѣдній суставъ лапокъ черноватые.

Видъ этотъ стоитъ ближе всего къ *Ar. melanocephalus*, но отличается, главнымъ образомъ, инымъ расположениемъ чернаго цвѣта на поверхности, рыжимъ цвѣтомъ передней части головы и формою переднеспинки, которая гораздо уже и бо-лѣе вытянута, чѣмъ у *Ar. melanocephalus*, и притомъ имѣть боковые края почти прямые.

Ar. fasciatus былъ открытъ Г. Н. Потанинымъ въ окрест-ностяхъ Троицкосавска, въ Забайкальской области.

12. *Geocoris turkestanicus* n. sp. — Schwarz. Pronotum quer, breiter als lang, schwarz, grob punktirt, Schulterecke bis zur Seitenrand-Mitte rothbräunlich, ein Mittelfleck auf dem Vorderrande orangegelb. Halbdecken fein punktirt schmutziggelb, Corium am Ende braun, Membran weisslich, vollstndig. Schild und Hinterleib ganz Schwarz.

♂. Kopf schwarz, vorn gelblich; Fhler oben weiss, Endglied bleichbrunlich. Beine ganz bleich rostgelblich.—

Lg. $2\frac{1}{2}$ mm.

♀. Kopf schwarz, Stirnschwiele am Ende rostgelblich;

Fühler dünn, lang, dunkelbraun, ihr 1-tes—3-tes Glied am Ende weisslich, Endglied ganz bleichbräunlich. Schenkel schwarz, Schenkelende, Schienbeine und Füsse rostgelblich. — Lg. 3 mm.

Turkestan (A. Kuschakewitsch).

Небольшой, черного цвета, съ блѣднобуроватыми надкрыльями и бѣловатыми усиками. Переднеспинка черного цвета; боковой край ея въ задней половинѣ, вмѣстѣ съ плечевымъ угломъ, рыжеватобурый; пятно или короткая полоска посерединѣ передняго края оранжевожелты; довольно густой и сильный пунктиръ покрываетъ всю поверхность, кроме узкой оторочки задняго края и сильныхъ выпуклостей впереди, которыхъ совершенно гладки. Щитокъ весь черный, покрытъ такимъ же пунктиромъ, какъ и переднеспинка; вдоль его проходитъ гладкое ребрышко, болѣе выпуклое у ♀. Надкрылья блѣднобуроватыя, или грязнобѣловатыя съ темнымъ пятномъ назади, постепенно бурѣющимъ къ мембранныальному шву; они покрыты довольно нѣжнымъ пунктиромъ, у основанія же почти гладкія; перепонка полна, бѣловатая. Брюшко сполна черного цвета.

♂. Голова какъ сверху, такъ и снизу черная, конецъ носа и поперечная полоса на переднемъ ея концѣ — желтоватыя; усики сверху бѣлаго цвета, послѣдній суставъ блѣднобуроватый. Ноги свѣтлорыжеватыя.

♀. Голова черная, конецъ носа и прилегающія къ нему части скуловыхъ отростковъ рыжеватыя; усики тонкие, длинные, темнобурые, концы первыхъ трехъ суставовъ бѣловатые, послѣдній суставъ весь блѣднобуроватый. Бедра черного цвета; концы ихъ, голени и лапки рыжеватыя.

Относится къ типу *G. Oschanini* Jak. и *G. desertorum* Jak., но отличается чернымъ снизу цветомъ головы, сполна чернымъ щиткомъ, болѣе тонкими и длинными усиами, ярко-желтымъ пятномъ на переднемъ краѣ переднеспинки и отсутствиемъ волосковъ на поверхности. Этотъ видъ близокъ также

къ описанному Рейтеромъ съ Алая *G. alaiensis* (Rev. d'Entom., 1885, p. 211); но послѣдняя форма отличается чернымъ цвѣтомъ переднеспинки и надкрыльевъ.

G. turkestanicus найденъ покойнымъ Кушакевичемъ въ количествѣ нѣсколькихъ экземпляровъ въ Туркестанѣ, вѣроятно—въ окрестностяхъ Вѣрнаго.

13. *Macropterna ornata* n. sp. — Körper schwarz, kahl. Kopf sehr fein behaart, Fühler schwarzbraun, ihr 2-tes Glied rostgelb und das 3-te bräunlich. Halsschild sehr glänzend, metallisch grünschimmernd, Hintertheil stark punktirt. Schild schwarz, am Ende bleichgelb. Halbdecken gelblich, am Grunde schwarz; über die Mitte des Corium eine breite braune Querbinde; Corium-Spitze bräunlich. Membran rauchbraun, mit 4 Rippen und 3 schneeweissen Flecken. Beine pechswarz, Knie, Schienbeine und Füsse gelblichweiss, am Ende rostgelb. — Lg. $2\frac{1}{2}$ mm.

Transcaspien (E. König). 1 Exemplar.

Туловище чернаго цвѣта, голое (кромѣ головы, которая одѣта мельчайшими волосками). Усики темнобурые, 2-й суставъ рыжій, вершина его и 3-й суставъ буроватые. Глаза весьма выпуклые, коричневаго цвѣта. Переднеспинка въ задней своей части довольно сильно пунктированная; вся поверхность ея блестящая съ сильнымъ зеленоватымъ металлическимъ отливомъ, который замѣтенъ также на головѣ, но въ болѣе слабой степени. Щитокъ черный, съ блѣдножелтой вершиной. Надкрылья желтоватыя; въ основаніи ихъ очень узкая, неправильная поперечная полоса чернаго цвѣта, посрединѣ широкая буроватая поперечная полоса, захватывающая заднюю часть *clavus'a*; конечные углы *corium'a* буроватые. Перепонка большая, съ 4 ребрами, и темнобураго цвѣта, съ 3 синеватыми пятнами; одно изъ этихъ пятенъ менѣе развитое, помѣщается у мембранального шва, посрединѣ его, а второе, овальной формы, занимаетъ всю вѣшнюю часть перепонки, отъ задняго угла *corium'a* до конца ея, третье же

пятно (или, вѣрнѣе, широкая оторочка) проходитъ по внутреннему ея краю. Туловище снизу черное, орифиціи и задний край заднегруди бѣловатые. Бедра смолисточерного цвѣта, вершина ихъ яркорыжая; голени и лапки желтоватобѣлые, съ рыжеватыми концами.

Одинъ экземпляръ изъ Закаспійской области (отъ Е. Г. Кенига).

14. *Hyalocoris longicollis* n. sp. — Dem *H. pilicornis* Jak. im Bau und Farbe sehr ähnlich. Pronotum schmal, auf $\frac{1}{2}$ langer als breit, Vordertheil sehr gewölbt. Vorderschenkel sehr dick, unterseits mit 2 Reihen scharfer Stachel. — Lg. 7 mm.

Transcaspien (E. König), 2 Exemplare.

По своей виѣшности очень близокъ къ *H. pilicornis* Jak., отъ которого отличается слѣдующими признаками: переднеспинка узкая, вытянутая, въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе своей ширины; передняя гладкая ея часть выпуклая и занимаетъ $\frac{2}{3}$ переднеспинки; бедра передней пары сильно утолщенные, съ двумя рядами зубцовъ съ нижней стороны; голени передней пары слегка изогнутыя, съ зубчиками на внутренней сторонѣ; голени остальныхъ паръ ногъ, кроме изрѣдка раскиданныхъ черныхъ шипиковъ, не имѣютъ другихъ волосковъ. У *H. pilicornis* переднеспинка короткая, почти одинаково развитая какъ въ длину, такъ и въ ширину; передняя площадка едва выпуклая, почти плоская, одинакового размѣра съ задней третьей; бедра слабо утолщенные, съ однимъ рядомъ зубчиковъ, другой же (задній) образованъ изъ щетиноекъ; голени заднихъ паръ снабжены, кроме черныхъ короткихъ шипиковъ, еще и весьма длинными прямоторчащими бѣловатыми волосками.

Два экземпляра этого вида найдены Е. Г. Кенигомъ въ Закаспійской области.

15. *Diomphalus annulicornis* n. sp. — Schwarz, ohne Borsten. Oberseite uneben, höckerig. Kopf langer als breit, vorn und unten gelblich, im Nacken gewölbt. Fühler kurz,

ihr 2-tes Glied kaum länger als das 4-te, schwarz geborstet, graugelblich, mit schwarzen Ringen oder Flecken, ihr Endglied schwarz. Halsschild fast doppelt breiter als lang, vorn sehr verschmälert. Membran fehlt. Bauch schwarz, Connexivum mit kaum sichtbaren gelblichen Flecken. Bauch unten und Schenkel schwarz, fein marmorirt. Schienbeine und Füsse gelblich, schwarz gefleckt und beborstet. — Lg. 4 mm.

Transbaicalien, Troizkossawsk (G. Potanin).

Черного цвета, съ поверхностью весьма неровной, безъ замѣтныхъ щетинокъ. Голова болѣе развитая въ длину, на затылкѣ выпуклая; передняя часть ея и нижняя сторона по-срединѣ желтоватыя; глаза небольшіе, очень выпуклые. Усики короткіе, 2-й суставъ едва длиннѣе 4-го; первые три сустава сѣроватожелтые, покрыты черными поперечными пятнами, въ видѣ колецъ, и довольно длинными черными щетинками; послѣдній суставъ черный. Переднеспинка короткая, почти вдвое шире своей длины, кпереди сильно съуженная, съ двумя сильными выпуклостями въ передней части. Какъ переднеспинка, такъ и щитокъ и надкрылья сплона черного цвета; перепонки нѣтъ. Брюшко сверху черное, ободокъ съ малозамѣтными желтоватыми пятнышками въ основныхъ углахъ сегментовъ; снизу брюшко черное, съ рѣдкими рыжеватыми пятнами. Бедра черного цвета, съ многочисленными рыжеватыми пятнышками; вершины бедръ, а также голени и лапки желтоватыя; послѣднія покрыты довольно крупными черными точками и рѣдкими щетинками, имѣя послѣдній суставъ черноватый.

Очень близокъ къ виду, бывшему донынѣ единственнымъ представителемъ рода *Diomphalus*, свойственнаго астраханскимъ степямъ, а именно къ *D. hispidulus* Fieb., отъ котораго, однако, отличается многими существенными признаками, въ особенности же формой переднеспинки и усиковъ, величиной глазъ и цветомъ. У *D. hispidulus* голова весьма выпуклая, глаза гораздо крупнѣе, усики длиннѣе, безъ черныхъ колецъ, пе-

реднеспинка почти квадратная и цвѣтъ туловища обыкновенно глинистый.

Новый видъ былъ найденъ Г. Н. Потанинымъ около Троицкого савска.

16. **Monanthia (Catoplatus) fulvicornis** n. sp. — Oberseite bleichgelblich, Kopf schwarz, Fühler und Beine rostgelb. Randfeld der Decken schmal, mit einer Reihe Maschen. Mittelkiel des Pronotums ganz durchlaufend, Seitenkiele vorn abgekürzt, nur auf der Hinterhälfte vorhanden. — Lg. $3\frac{1}{2}$ mm.

Ass-chabad (A. Komarow), einige Exemplare.

Верхняя сторона блѣдно-желтаго цвѣта, голова черная, усики и ноги рыжие. Среднее ребро переднеспинки проходитъ по всей ея длине, а два боковыхъ — короткія и явственныя только на заднемъ отросткѣ. Надкрылья узкія, наружный край ихъ въ одинъ рядъ клѣтоекъ.

По наружному виду онъ стоитъ ближе всего къ *M. Horvathi* Put., отъ которого отличается рыжими усиками и цвѣты срединнымъ ребромъ переднеспинки (у *M. Horvathi* усики черные и среднее ребро укороченное).

Нѣсколько экземпляровъ изъ окрестностей Асхабада, отъ А. В. Комарова.

17. **Aradus Nemtschinowi** n. sp. — Körper und Extremitäten schwarz. Kopf schmal, länger als breit; Fühler lang, feingekörnt, ihr 2-tes Glied sehr dünn, etwas länger als Kopf, zum Ende allmählig (aber sehr fein) verdickt, am Grunde knotig verbreitet; 3-tes Fühlerglied doppelt kürzer als das 2-te, Endglied auf $\frac{1}{4}$ kürzer als das 3-te. Schnabel an das Ende der Mittelbrust reichend. Halsschild schmal, Seitenrand fein gezahnt, Schulterecke vorn gerade, Halsecke mit 2 Stacheln. Seitenrand des Corium am Grunde leicht verbreitert, vor der Mitte des Corium eine breite gelbliche Querbinde. Connexivum schmal, schwarz; Schnitte gelb gesäumt. Beine schwarz, Knie blassbräunlich. — Lg. $5\frac{1}{2}$ mm.

Amur-Gebiete, Fluss «Zeja» (Frau M. Nemtschinow).

Форма, близкая къ *Ar. lugubris*, но отличающаяся многими рѣзкими признаками, преимущественно же строениемъ усиковъ, большими шипами на шейномъ углѣ переднеспинки, замѣтнымъ расширениемъ надкрыльевъ у основанія и свѣтлой поперечной полосой на нихъ. Туловище узкое, съ краями параллельными, чернаго цвѣта, такъ же какъ и всѣ конечности. Глаза выпуклые, темнобурье. Голова узкая, болѣе развитая въ длину, съ высокимъ коническимъ бугоркомъ передъ глазами; усики тонкие, длинные, 2-й суставъ ихъ весьма тонкий, постепенно (но очень слабо) расширяющійся кверху, съ замѣтнымъ узелкомъ въ основаніи; этотъ суставъ нѣсколько длиннѣе головы и вдвое длиннѣе 3-го, который, въ свою очередь, на $\frac{1}{4}$ длиннѣе 4-го. Усики имѣютъ замѣтно шиповатую поверхность. Хоботокъ достигаетъ до конца среднегруди. Переднеспинка гораздо уже, чѣмъ у *Ar. lugubris*, въ плечевой области не округленная, а прямая; боковые края ея мелко-зубчатые, на шейномъ углѣ помѣщается пара тупыхъ шиповъ, изъ которыхъ виѣшній достигаетъ значительной величины; ребра переднеспинки выпуклые, во всю длину ея; средняя пара ихъ кпереди постепенно сближается. Щитокъ длинный, узкій. Основаніе надкрыльевъ одинаковой ширины съ переднеспинкой; боковой край ихъ въ основаніи слабо, хотя и замѣтно расширенный, съ широкой желтоватой поперечной полосой, проходящей нѣсколько отступая отъ основанія; ребра всѣ черноватыя. Перепонка такая же какъ у *Ar. lugubris*, но поперечные жилки на ней гораздо рѣже. Брюшной ободокъ мало выдающійся изъ-подъ надкрыльевъ, съ узкими желтоватыми полосками по заднему краю сегментовъ. Туловище снизу и ноги черныя, лишь колѣна съ блѣднобуроватымъ оттенкомъ.

У *Ar. lugubris* усики съ болѣе толстыми и укороченными суставами, причемъ 2-й суставъ гораздо короче головы; переднеспинка же съ краями ровными, мелковернистыми, безъ шиповъ впереди.

Одинъ экземпляръ найденъ былъ М. М. Нѣмчиновой по р. Зеѣ, у станціи Овсанки, на Амурѣ.

18. *Aradus morio* n. sp. — Körper und Extremitäten ganz schwarz. Kopf länger als breit; Fühler kurz, dünn, ihr 2-tes Glied viel kürzer als der Kopf, zum Ende allmählig verdickt, am Grunde knotig, ihr 3-tes Glied auf $\frac{1}{4}$ kürzer als das 2-te. Schnabel sehr kurz, nur auf die Vorderhüften reichend. Halsschild doppelt breiter als lang, Seitenrand fein gekörnt, vor der Halsecke leicht ausgeschweift; Halsecke spitz, Schulterecke breit abgerundet. Seitenrand des Corium am Grunde stark verbreitert und abgerundet. Connexivum breit, mit kleinen gelblichen Flecken auf den Einschnitten. — Lg. 7 mm.

Amur-Gebiete, Fluss «Zeja» (Frau M. Nemtschinow).

Туловище и конечности сплона черного цвета, только задние углы сегментовъ на брюшномъ ободкѣ желтоватые. Голова болѣе развитая въ длину, съ сильнымъ тупымъ бугоркомъ передъ каждымъ глазомъ; усики короткие, тонкие, 2-й суставъ ихъ значительно короче головы, постепенно расширяющійся кверху, съ узелкомъ у основанія, 3-й суставъ на $\frac{1}{4}$ короче 2-го и почти на $\frac{1}{2}$ длини 4-го, который на концѣ покрытъ бѣловатыми волосками. Переднеспинка широкая, вдвое шире своей длины, съ боковыми краями ровными, мелкозернистыми, плечи выдающіяся, широко округленныя, прямо спускающіяся и суживающіяся кзади; передъ шейнымъ угломъ край слегка вырезанъ, самый уголъ прюостренный. Надкрылья въ основной половинѣ сильно расширенныя и широко округленныя. Хоботокъ весьма короткий, достигающій только до передней пары ногъ.

Видъ этотъ долженъ быть поставленъ рядомъ съ *Ar. crenaticollis* Sahlb., отъ которого отличается, кроме сплона черного цвета, весьма характерными короткими усиками, значительнымъ расширениемъ боковыхъ краевъ надкрыльевъ въ ихъ основаніи, а также очень короткимъ хоботкомъ, который у *crenaticollis* достигаетъ до половины среднегруди.

Найденъ М. М. Нѣмчиновой въ той же мѣстности, гдѣ и предыдущій видъ.

19. *Hydrometra Jankowskii* n. sp. — Oberseite und Extremitäten zimmtbraun, Unterseite schwarz, seidenartig behaart. Kopf schwarz, Querstreif im Nacken und 2 Flecken vor den Augen rostbraun. Fühler dünn, ihr Wurzelglied viel länger als der Kopf, aber bedeutend kürzer als Glied 2 und 3 zusammen (deren jedes dem 4-ten gleichlang). Schnabel rostbraun, Endglied schwarz. Vordertheil des Pronotums schwarz mit 3 durchlaufenden rostgelben Streifen, Hintertheil rostbraun mit 3 Kielen. Oberseite des Pronotums farblos punktirt und fein quergerunzelt. Bauch schwarz, Connexivum rostbraun mit silberweissen Flecken; Hinterecke des 6-ten Hinterleibringes sehr kurz, stumpf. Hinterschenkel so lang als Mittelschenkel (beim ♂) oder Mittelschenkel etwas länger als Hinterschenkel (beim ♀). — Lg. ♂ $11\frac{1}{2}$ —12 mm., lg. ♀ 14 mm.

Ussuri-Gebiete, Fluss Sidemi (M. Jankowski).

Туловище довольно толстое; верхняя поверхность его и вся конечности коричневобураго цвета, нижняя сторона черная, покрытая шелковистым, съроватым пушкомъ (кромѣ боковыхъ частей груди, которые одѣты буровато-золотистымъ пушкомъ). Голова черноватая, поперечная полоса на затылкѣ и пятна впереди глазъ рыжеватобурыя. Усики тонкие, длинные, одноцвѣтные; 1-й суставъ ихъ гораздо длиннѣе головы, но значительно короче 2-го и 3-го суставовъ, вмѣстѣ взятыхъ; послѣдніе три сустава одинаковой длины. Хоботокъ рыжеватобурый, послѣдній суставъ черный. Передняя доля переднеспинки черная, съ 3 рыжими продольными полосками, одной посрединѣ и двумя боковыми; задняя доля буроваторыжая, съ тремя ребрами, изъ которыхъ среднее — свѣтлѣе общаго цвета, а плечевые — черные; переднеспинка покрыта поверхностью безцвѣтнымъ пунктиромъ и слабыми поперечными морщинками. Брюшко черное, ободокъ его рыжеватобурый, съ серебристобѣлыми пятнами въ переднихъ углахъ сегментовъ. Задніе углы 6-го сегмента очень короткие, тупые; у ♂ на этомъ сегментѣ снизу простая вырѣзка, у ♀ онъ прямо об-

рѣзанъ и на концѣ буроватый. Въ основаніи брюшка снизу очень тонкое, продольное ребрышко посрединѣ. Ноги однокрылые, бедра двухъ заднихъ паръ одинаковой длины у самца, у самки же среднія длиннѣе задніхъ. У самцовъ надкрылья иногда развиты только въ половину.

Открытъ М. И. Янковскимъ близъ Сидеми.

20. *Prostemma lugubris* n. sp. — Ganz schwarz, ohne Metallschimmer. Halbdecken abgekürzt, schwarzbraun, Corium-Spitze rostbraun, Corium-Rippe sehr stark, kielförmig, beiderseits tief und grösst punktirt. Membran fehlt. Schienbeine und Füsse bräunlichgelb. — Lg. 8 mm.

Amur-Gebiete, Fluss «Zeja» (Frau M. Nemtschinow).

Чернаго цвѣта, блестящій, безъ металлическаго отлива, густо одѣтый длинными черными и бурющими волосками. Голова очень узкая, длинная; усики черные, такъ же какъ и хоботокъ, у котораго послѣдній суставъ рыжій. Переднеспинка узкая, въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе своей ширины; въ задней своей трети она весьма грубо и густо морщинисто пунктирована; передняя окраина съ густымъ, но мелкимъ пунктиромъ. Щитокъ черный, матовый, лишь острыя вершина его блестящая. Надкрылья укороченныя, съ узкой оторочкой вмѣсто перепонки, матовые, густо одѣтые рыжеватыми волосками; цвѣтъ ихъ, почти черный у основанія, переходитъ далѣе въ темнобурый, вѣнчній же задній уголъ corium'a темнорыжій; ребра, проходящія вдоль надкрыльевъ, очень сильныя, выпуклые, съ обѣихъ сторонъ ограниченныя рядомъ глубокихъ крупныхъ точекъ. Брюшко черное, полублестящее, сверху густо покрытое весьма мелькими морщинками и точками. Ноги чернаго цвѣта, вершины бедръ, голени и лапки желтоватобурыя; голени къ концу постепенно темнѣе.

Видъ этотъ, найденный Г-жею Нѣмчиновою на Зеѣ, рѣзко отличается отъ всѣхъ другихъ темной окраской надкрыльевъ и сильнымъ развитиемъ на нихъ реберь.

21. *Opsicoetus tenuicornis* n. sp. — Braunschwarz. Halbdecken und Schild rostgelb behaart. Kopf doppelt länger als

breit, im Nacken gleich schmutziggelb. Fühler sehr dünn, bleichbräunlich, graugelb behaart; ihr 2-tes Glied vor dem Ende mit schwarzem Ring, ihr Wurzelglied auf $\frac{1}{3}$ kürzer als Kopf, 2-tes Glied am Ende verbreitert und $2\frac{1}{2}$ mal länger als das 1-te, 3-tes Glied fast doppelt länger als das 2-te und 4-tes Glied an $\frac{3}{4}$ vom 3-ten. Halsschild schwarzbraun, Vordertheil ziemlich glänzendglatt, Hintertheil matt, schagrinartig und dicht fein bestachelt. Halbdecken fast durchsichtig, weisslich, Saum bräunlich, Clavus-Grund braun; Membran sehr lang, glasartig, Querfleck am Grunde, ein Fleck in der ersten Membranzelle und ein Randfleck schwarzbraun. Connexivum einfarbig, bräunlich. Beine schmutziggelb, Schienbeinende bräunlich. Alle Schenkel unten, der ganzen Länge nach, mit 2 Reihen kleiner Zähnchen; Schienbeine gerade, «*Fossa spongiosa*» der Vorderschiene sehr kurz. Hinterfüsse dreigliederig, Hinterfusswurzel kürzer als das 2-te Glied, 3-tes Glied so lang wie Glied 1 und 2 zusammen. Schienbeine und Füsse sehr lang behaart. — Lg. 14 mm.

Transcaspien (E. König).

Туловище темнобурое, мѣстами почти черное; щитокъ и надкрылья покрыты полустоячими рыжеватыми волосками; на брюшкѣ волоски прилегающіе, яркорыжаго цвѣта. Голова вдвое длиннѣе своей ширины, съ большими маловыдающимися глазами, вся темнобураго цвѣта, кроме затылка, который грязно-желтоватаго цвѣта. Хоботокъ буроватый, весьма короткий, не достигающій до переднегруди. Усики весьма длинные, тончайши; 1-й суставъ ихъ на $\frac{1}{3}$ короче головы, 2-й въ $2\frac{1}{2}$ раза его длиннѣе, 3-й почти вдвое длиннѣе 2-го и 4-й на четверть короче 3-го и въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе 2-го; всѣ суставы блѣднобуроватые, изъ нихъ 2-й на вершинѣ расширяется, а передъ вершиной имѣетъ черное кольцо; послѣдніе три сустава одѣты сѣроватожелтыми, не густыми волосками, изъ которыхъ одни болѣе короткіе, полуприлегающіе, другіе же болѣе длинные, прямостоячіе. Переднеспинка темнобурая;

передняя довольно гладкая ея часть нѣсколько свѣтлѣе, задняя — матовая, весьма густо шагринированная и покрыта, такъ же какъ и щитокъ, многочисленными мелкими шипиками. Щитокъ у основанія блѣднѣе, съ длиннымъ отросткомъ, слегка загнутымъ вверхъ на концѣ. Надкрылья полупрозрачныя, бѣловатыя, съ темнобурымъ наружнымъ краемъ, свѣтлѣющимъ къ концу *corium'a*; основная половина *clavus'a* бурая. Пере-
понка большая, гораздо длиннѣе брюшка, полупрозрачная, стекловидная; поперечная полоса въ основаніи ея, овальное пятно въ центрѣ большой клѣтки и другое посерединѣ ви-
наго края — темнобурый. Брюшной ободокъ одноцвѣтный, буроватый; брюшко посерединѣ и среднія части груди грязно-
желтоватыя. Ноги одноцвѣтныя, буроватожелтаго цвѣта, концы голеней темнѣе; бедра всѣхъ паръ ногъ съ двойнымъ рядомъ небольшихъ, но густо насаженныхъ зубчиковъ; на передней парѣ сверхъ того раскидано (особѣнно — съ внутренней сто-
роны) множество такихъ же зубчиковъ, безо всякой правиль-
ности. Голени прямые, губчатая подошва на передней парѣ ихъ
весьма короткая; лапки задней пары такой же длины и формы,
какъ у *Ops. testaceus* H.-S., т. е 1-й суставъ короче 2-го, а
3-й равенъ въ длину обоимъ этимъ суставамъ, вмѣстѣ взятымъ.
Голени въ задней своей половинѣ и лапки покрыты очень
длинными рыхлыми волосками.

Описываемый видъ отличается отъ всѣхъ прочихъ *Opsi-*
coetus'овъ двойнымъ рядомъ зубчиковъ, сидящихъ на всѣхъ бед-
рахъ съ нижней стороны, короткимъ хоботкомъ, темнымъ цвѣ-
томъ туловища и чрезвычайно тонкими и длинными усиками,
2-й суставъ которыхъ на вершинѣ замѣтно утолщенъ.

Одинъ экземпляръ найденъ Е. Г. Кенигомъ въ Закас-
пійской области.

22. *Harpactor analis* n. sp. ♂. — Ganz schwarz, matt,
gräulich weiss abstehend behaart; Hinterleib glänzend. Kopf sehr
schmal, verlängert, zwischen den Ocellen ein rostgelber Quer-
fleck. Fühler schwarz, ihr 3-tes und 4-tes Glied schwarzbraun,

Wurzelglied fast so lang als der Kopf, 2-tes Glied das kleinste (mehr als doppelt kürzer als das 1-te Glied und $1\frac{1}{2}$ mal kürzer als das 3-te), Endglied das längste (viel länger als das 1-te). Connexivum breit, schwarz, mit weisslichen durchsichtigen Punkten auf den Einschnitten; Genitalsegmente roth. Beine schwarz, Füsse rostgelblich, Hinterschienbeine zum Ende verdünnt. — Lg. $12\frac{1}{2}$ mm.

Transcaucasien, Ordubat (H. Christof).

Туловище и конечности черного цвета, одетыя съроватобѣлыми стоячими волосками, которые мѣстами, на задней половинѣ переднеспинки и на щиткѣ, принимаютъ буро-ватый оттѣнокъ. Голова длинная, очень узкая, такъ что длина ея втрое болѣе ширины; на затылкѣ между простыми глазками замѣтно небольшое оранжевое пятно. Усики черного цвета, два послѣдніе сустава съ буроватымъ оттѣнкомъ; 1-й суставъ ихъ въ длину почти равняется головѣ, 2-й короче прочихъ и въ $2\frac{1}{2}$ раза короче 1-го, 3-й въ $1\frac{1}{2}$ раза длиннѣе 2-го, а 4-й самый длинный и гораздо длиннѣе 1-го. Брюшной ободокъ широкій, черный, съ бѣловатыми просвѣчивающими точками въ мѣстахъ соединенія брюшныхъ колецъ; послѣдній суставъ брюшка ярковкрасный. Ноги черного цвета, лапки ржеватыя; голени задней пары ногъ къ концу постепенно утоншаются. — Дл. $12\frac{1}{2}$ мм., ширина брюшка $4\frac{1}{2}$ мм.

Одинъ самецъ, найденный Г. Ф. Кристофомъ въ Ордубатѣ.

23. *Harpactor flavolimbatus* n. sp. — Ganz schwarz, grauweiss und bräunlich behaart. Oberseite matt, Hinterleib unten glänzend. Fühler schwarz, ihre beide letzten Glieder schwarzbraun; Wurzelglied beim ♂ etwas länger als der Kopf und um $\frac{1}{3}$ länger als das 2-te Glied. Endglied kaum kürzer als das 1-te Glied. Ein Fleck zwischen den Ocellen und Connexivum bleichgelblich; Connexivum-Schnittst點ke mit schwarzen Grundflecken. Beine schwarz, Füsse braun; Schenkel am Ende etwas knotenförmig; Hinterschienbeine dünn, gerade.—Lg. 16 mm.

Transcaucasien, Ordubat (H. Christoph).

Туловище и конечности черного цвета, покрытыя съроватобѣлыми и буроватыми волосками. Наружная поверхность матовая, брюшко снизу блестящее. Пятно на затылкѣ и брюшной ободокъ свѣтло желтоватые; послѣдній съ большими черными пятнами въ основныхъ углахъ брюшныхъ кольцъ. Бедра на концахъ слегка узловатыя; голени двухъ заднихъ паръ ногъ тонкія, прямые, цилиндрическія, голени передней пары болѣе утолщены и слегка искривлены передъ концомъ; лапки темнобураго цвета. Усики черные, послѣдніе два сустава съ буроватымъ оттенкомъ; 1-й суставъ ихъ нѣсколько длиннѣе головы и на треть длиннѣе 2-го, который, въ свою очередь, на треть длиннѣе 3-го; послѣдній суставъ едва короче 1-го.

Одинъ экземпляръ изъ окрестностей Ордубата, найденный Г. Ф. Кристофомъ.

Видъ этотъ очень похожъ на *H. Christophi* Jak. (изъ Персии), но отличается тонкими цилиндрическими голенями задней пары ногъ, которыхъ у *H. Christophi* утолщены и вееренообразной формы; кроме того, 2-й суставъ усиевъ у этого послѣднаго вида значительно короче 3-го.

24. **Salda suturalis** n. sp. — Körper und Extremitäten schwarz, matt, Oberseite sehr fein punktirt und sehr kurz gräulich behaart; Halbdecken silberweiss beschuppt. Ocellen weit entfernt. Fühler dünn, schwarzbeborstet, ihr 2-tes Glied dreimal länger als das 1-te und so lang wie Glied 3 und 4 zusammen. Halsschild sehr kurz, breit, Seitenrand gerade, Vorderrand etwas schmäler als Kopf mit Augen; Hintertheil des Pronotums fein querrunzelig. Schild breit, gleichseitig, am Ende spitz. Halbdecken breit, Membran vollständig, mit rostbraunen Flecken, innere und 4-te Zellen der Membran abgekürzt. Schlussnaht breit, glänzend. Körper unten schwarz, sehr fein und dicht graugelb behaart, Vorderrand der Vorderbrust weisslich. Beine ziemlich dünn, lang, Schienenbeine schwarz bedornt, Füsse bräunlich. — Lg. $5\frac{1}{2}$ mm.

Amur-Gebiete, Fluss «Zeja» (Frau M. Nemtschinow).

Туловище и конечности матовочерного цвета, лишь лапки и нѣсколько пятенъ въ клѣткахъ перепонки рыжеватыя. Наружная поверхность покрыта мельчайшимъ пунктиромъ и мало-замѣтнымъ сѣроватымъ пушкомъ; надкрылья, сверхъ того, одѣты серебристыми чешуйками. Простые глазки широко разставлены; усики черные, тонкіе, покрытые длинными черными щетинками; 2-й суставъ ихъ втрое длиннѣе 1-го, а два послѣднихъ имѣютъ одинаковую длину, будучи вдвое короче 2-го. Переднеспинка очень короткая, широкая, съ боковыми краями прямymi, сильно съуживающимися кпереди; передний край ея немного уже головы, взятой съ глазами; задняя ея половина съ очень тонкими поперечными морщинками. Щитокъ широкий, равносторонній, съ острой вершиной. Надкрылья очень расширенныя, съ полной перепонкой, первая клѣтка которой (внутренняя) далеко не достигаетъ вершины второй, а четвертая клѣтка короче всѣхъ прочихъ. Сутуральный шовъ широкий, блестящаго чернаго цвета. Снизу все туловище черное, кромѣ передней части переднегруди, которая бѣловатая и одѣта мельчайшимъ, но густымъ сѣроватожелтымъ пушкомъ. Ноги довольно тонкія, длинныя, голени снабжены короткими черными щитиками.

Этотъ видъ долженъ стоять рядомъ съ *S. littoralis*, къ которому онъ близокъ, отличаясь, кромѣ однообразнаго чернаго цвета, многими особенностями. Такъ, всѣ конечности у нашего вида гораздо тоньше, чѣмъ у *S. littoralis*; 1-й суставъ усиковъ значительно короче, чѣмъ у послѣдняго вида; переднеспинка менѣе съужена кпереди, такъ что передній край ея у *S. suturalis* едва уже головы, взятой вмѣстѣ съ глазами, тогда какъ у *S. littoralis* этотъ край одинаковой ширины съ затылкомъ, большие же глаза выдаются значительно далѣе его; задняя половина переднеспинки у *S. littoralis* гораздо короче передней выпуклой ея части и весьма нѣжно пунктирована, тогда какъ у нашего вида задняя часть почти одинаковой ширины съ весьма слабо выпуклой передней, и притомъ, кромѣ пунктира,

имѣть еще рѣзкія поперечныя морщинки; простые глазки у него широко разставлены, а у *S. littoralis* почти слитные.

Найденъ М. М. Нѣмчиновой на берегу Зеи, у Зейской пристани.

25. *Ectemnus magnicornis* n. sp. — Körper schwarz. Kopf doppelt langer als breit, oben zerstreut abstehend behaart. Fühler schwarz, ihr 3-tes Glied weisslich, ihr 2-tes Glied sehr dick, spindelförmig, fast so lang wie der Kopf, ganz abstehend lang behaart. Halbdecken abgekürzt, schwärzlich, Corium-Grund weisslich. Beine schwarz, Schienenbeine und Füsse bleich rost-gelblich. — Lg. $2\frac{3}{4}$ mm.

Taurien, Fluss Alma (G. Rybakow), 1 Exemplar.

Чернаго цвѣта, слабо блестящій. Голова вдвое длиннѣе своей ширины, покрытая сверху рѣдкими стоячими волосками, съ усиками оригинальной формы, чернаго цвѣта (кромѣ 3-го сустава, который весь бѣловатый); 1-й суставъ усиковъ далеко не достигаетъ конца носа, 2-й въ длину едва короче головы, очень толстый, веретенообразной формы и покрытый длинными стоячими волосками чернаго цвѣта, 3-й весьма короткій и 4-й нѣсколько длиннѣе его. Задняя часть переднеспинки очень мелко шагринирована. Надкрылья укороченные, черноватыя, вѣшняя часть corium'a у основанія съ широкой бѣловатой полоской, идущей вдоль clavus'a. Ноги чернаго цвѣта, голени и лапки блѣднорыжеватыя, изъ нихъ первыя у основанія и на концѣ буроватыя.

Одинъ экземпляръ найденъ Г. Г. Рыбаковымъ въ Крыму.

26. *Capsus ater* n. sp. — Schwarz, Oberseite weitläufig grob punktirt. Kopf langer als breit, Querfleck im Nacken rost-gelb. Fühler sehr lang, bräunlich behaart, ihr Wurzelglied so lang wie der Kopf und viel langer als Hinterrand des Pronotums, ihr 2-tes Glied etwas über dreimal langer als das 1-te, nach oben allmälig verdickt. Schnabel schwarzbraun, Wurzelglied oben rostgelblich. Schild gewölbt, breiter als lang, ganz punktirt und quergerunzelt. Cuneus-Grund aussen weisslich. Unten

schwarz, Stinkdrüschen-Oeffnungen weiss. Beine schwarz, Schienbeine rostgelblich, am Grunde und am Ende braungeringelt. Schienbeine und Füsse rostgelb behaart und bewimpert. — Lg. $7\frac{1}{2}$ —8 mm.—Irkutsk. Seltener.

Все туловище, надкрылья и конечности черного цвета; поверхность тела (кроме головы) покрыта крупными, глубокими, широкоразставленными точками. Голова более развитая в длину, член в ширину, широкое поперечное пятно на затылке рыжеватое. Усики очень длинные, 1-й сустав их одинаковой длины с головой и выдается на половину дальше ее вперед, а 2-й в $2\frac{1}{2}$ раза длиннее 1-го и значительно длиннее заднего края переднеспинки, постепенно утолщающейся в вершине; первые два сустава черного цвета, последние бледнорыжеватые, основание 3-го сустава бледноватое; все они покрыты довольно длинными прилегающими волосками, буроватыми на первых суставах и более светлыми на последних. Хоботок темнобурый, почти черный, первый сустав его сверху рыжеватый. Щиток выпуклый, более развитый в ширину, весь покрытый пунктиром и поперечными морщинками. Cuneus черного цвета, слабо пунктированный, с бледноватым пятном на внешнем переднем угле. Перепонка дымчатобурая, с бледным пятном в основании внешнего угла, с сильными темнобурыми ребрами. Нижняя сторона туловища вся черная, только устьица отдельных желез бледные. Ноги черные, концы бедра и голени бледнорыжеватые; широкое кольцо в основании голеней и вершины их бурые. Голени и лапки покрыты рыжеватыми волосками и щетинками.

Очень похож на *C. scutellaris* var. *morio*, но отличается большей величиной, весьма крупными и редкими точками пунктира, удлиненной головой и пунктированным щитиком; у var. *morio* пунктир мельче и гораздо гуще, голова более развитая в ширину и щиток совершенно гладкий.

Изредка встречается в окрестностях Иркутска.

27. *Capsus quadrimaculatus* n. sp. — Schwarz, glän-

zend grob punktirt, Kopf und Schild glatt. Kopf im Nacken mit einer gelblichen Querlinie. Fühler schwarz, ihr 3-tes und 4-tes Glied bräunlich (3-tes Glied am Grunde weisslich), Wurzelglied dünn und viel kürzer als der Kopf, 2-tes Glied viermal länger als das 1-te, spindelförmig, dicht lang schwarzbehaart. Schild sehr gewölbt. Halbdecken schwarz, ein Grundfleck und Cuneus roth, Cuneus-Spitze schwarz. Schienbeine breit weisslich geringelt. — Lg. 6—7 mm.

Transcaucasien, Azkhur (H. Christoph), einige Exemplare.

Черного цвета, блестящий, довольно выпуклый, съ поверхностью грубо пунктированной (кромѣ головы и щитка, которые совершенно гладкие). Голова небольшая, съ очень выпуклыми глазами, высокимъ рубчикомъ поперекъ затылка и желтоватой поперечной полоской впереди рубчика. Усики черные, основание 3-го сустава бѣловатое, послѣдние два сустава буро-ватые; основной суставъ тонкий, гораздо короче головы, а 2-й постепенно утолщающійся къ вершинѣ, веретенообразной формы, густо одѣтый черными, довольно длинными, прилежащими волосками, вчетверо длиннѣе основнаго сустава; 3-й едва длиннѣе 1-го и замѣтно длиннѣе 4-го, оба послѣдніе сустава тонкіе, нитевидные, очень густо одѣтые короткими шелковистыми волосками. Хоботокъ весь черный. Щитокъ очень выпуклый. Надкрылья черные, большое пятно въ основаніи ихъ, захватывающее также clavus, и клиновидная часть (cuneus), кромѣ конца, красная. Ноги черные, на каждой голени по два широкихъ бѣловатыхъ кольца. Нижняя сторона туловища черная, переднегрудь по бокамъ и устьица отдельныхъ желеzъ бѣлыя.

Найденъ Г. Ф. Кристофомъ въ Азхурѣ.

28. *Capsus nebulosus* n. sp. — Körper lang gestreckt, schwarz. Kopf viel langer als breit, glänzend schwarz, mit dreieckigem gelben Fleck im Nacken; Fühler schwarz, dicht braun behaart, ihr 2-tes Glied stabförmig; Schnabel auf die Hinterhüften reichend. Halsschild vorn stark verengt, so lang als breit, dicht und ziemlich grob punktirt, schwarz, Hinterrand

des Halsschildes gelb. Schild gewölbt, glatt, schwarz, Grundwinkel und Spitze gelb. Halbdecken dicht und grob punktirt, bleich bräunlich mit dunkleren Nebelflecken; Clavus am Grunde und Ende schwärzlich, Membran rauchbraun, Rippen schwarz. Beine braun, Schienbeine mit gelblichen breiten Ringen.—Lg. $7\frac{1}{2}$ mm., lat. $2\frac{3}{4}$ mm.—Süd-Westl. Baical-Ufer, bei Kultuk, 1 Exemplar.

Туловище длинное, вытянутое, черного цвета. Голова более развитая въ длину, блестящаго черного цвета, гладкая, съ большими трехъ-угольнымъ, замѣтно вдавленнымъ пятномъ на затылкѣ; усики черные, густо покрыты короткими буро-ватыми волосками; 2-й суставъ ихъ въ $2\frac{1}{2}$ раза длиннѣе 1-го, одинаковой толщины по всей своей длине. Хоботокъ достигаетъ до задней пары ногъ; онъ темнобурый, въ мѣстахъ сочлененія суставовъ рыжеватый. Переднеспинка стуженная кпереди, одинаково развитая какъ въ длину, такъ и въ ширину, вся густо и довольно грубо пунктированная, съ тонкимъ продольнымъ ребрышкомъ посерединѣ, не достигающимъ ни передняго, ни задняго края; она блестящаго черного цвета, а узкая оторочка задняго края желтая. Щитокъ выпуклый, гладкий, блестящаго черного цвета; острия вершина его и пятно въ каждомъ основномъ углу желтые. Надкрылья густо и довольно сильно пунктированныя, свѣтлобуроватыя, съ болѣе темными туманообразными пятнами; основаніе и конецъ замковой части (clavus) черноватые; надъ мембраннымъ швомъ замѣтны бѣловатыя парные пятна; cuneus бурый, къ концу постепенно темнѣющій; въ основаніи его по наружному краю проходитъ бѣловатая полоса, другая такая же полоска помѣщается на внутреннемъ краѣ, въ основаніи малой клѣтки перепонки; эта послѣдняя дымчатобурая, въ основаніи болѣе свѣтлая, съ черноватыми ребрами клѣтокъ; она гораздо длиннѣе брюшка. Снизу туловище черное, густо волосистое, съ бѣловатыми окраинами суставовъ груди и такими же отверстіями отдѣлительныхъ железъ. Ноги темнобурыя, съ широкими желтоватыми больцами въ основной половинѣ голеней.

Единственный экземпляръ найденъ на юго-западномъ берегу Байкала, въ окрестностяхъ села Култука.

29. *Agaliastes fulvicornis* n. sp. — Schwarz, fein runzelig punktirt und graugelb behaart. Kopf glänzend glatt, Nacken mit gelber kielförmiger Querleiste und durchlaufender Mittelfurche. Fühler rostgelb, ihr 2-tes Glied am Grunde und am Ende braun geringelt, so lang als Kopf im Nacken und fast so lang, wie das 3-te und das 4-te zusammen genommen. Schnabel bräunlich, auf die Mittelhüften reichend. Membran vollständig, rauchbraun. Schenkel schwarz, Schienbeine rostgelb, schwarz punktirt und lang bedornt.—Lg. 2 $\frac{1}{2}$ mm.

Nördl. Mongolien, zwischen den Flüssen «Chara» und «Boro». (G. Potanin).

Черный, полублестящій, покрытый нѣжными пепельножелтыми волосками. Голова гладкая, блестящая съ продольной бороздкой на затылкѣ; поперечный затылочный рубчикъ очень высокій, яркорыжій; усики яркорыжіе, 2-й суставъ ихъ у основанія и на вершинѣ съ буроватыми кольцами; этотъ суставъ одинаковой длины съ шириной затылка и почти равенъ двумъ послѣднимъ суставамъ, вмѣстѣ взятымъ. Хоботокъ буроватый, достигающій до второй пары ногъ. Переднеспинка въ передней своей части покрыта мельчайшимъ пунктиромъ, въ задней же и на щитѣ — весьма нѣжными поперечными морщинками. Перепонка полная, свѣтлодымчатая, ребра ея кѣтоеъ буроватыя. Бедра черные, вершины ихъ, голени и лапки рыжія; голени заднихъ двухъ паръ покрыты черными пятнами и длинными щетинками.

Отъ *Ag. publicarius* отличается однообразнымъ цвѣтомъ усиковъ, бороздкой на затылкѣ и болѣе длинной переднеспинкой, а отъ *Ag. Wilkinsoni* D.-S. — присутствиемъ черныхъ пятенъ на голеняхъ.

Найденъ Г. Н. Потанинымъ въ Сѣверной Монголіи, между рѣками Хара и Боро.