

свободны отъ точекъ; самыя точки пунктира имѣютъ видъ глубокихъ, продольныхъ черточекъ. Части груди снизу все покрыты точками, нѣсколько рѣже расположеными, менѣе глубокими и обыкновенной формы. Очень грубый пунктиръ находится также по бокамъ щитка, особенно къ его концу, только высокое и острое ребро щитка совершенно гладкое; возвышенная, основная часть щитка покрыта болѣе нѣжными и рѣдкими точками. Вдоль *clavus* и *corium* идетъ по пяти правильныхъ рядовъ точекъ; главное ребро очень высокое, идетъ близко къ боковому краю, который совершенно гладкій. Вдоль надкрыльевъ также проходитъ гладкая полоска, расширяющаяся внизу, которая нѣсколько темнѣе общаго цвѣта тѣла. Голени покрыты очень нѣжными волосками и кроме того имѣютъ съ внутренней стороны рядъ рѣдкихъ щетинокъ. Самецъ неизвѣстенъ, ♀ достигаетъ $4\frac{1}{2}$ — 5 мм. Два экземпляра этого вида было открыто С. М. Сольскимъ въ Лужскомъ уѣзде, С.-Петербургской губерніи.

5. *Poeciloscytus intermedius* n. sp. Blassgrünlichgelb, fein silberweiss behaart. Fühler röthlich, Wurzelglied am Grunde und Ende mit schwarzem Ring. Kopf, vier Streifen auf dem Pronotum, Schild, Mitte der Vorder- und Mittelbrust schwarz, zwei Flecke vorn am Kopfe, Tylus und Schildspitze gelb. Halbdecken bräunlichgelb, Randlinie des Corium schwärzlich. Im Clavus drei, im Coriumende zwei Streifen bräunlich. Cuneus blutroth, am Rande schwarz; Grund und Spitze gelblich. Rücken grünlich, Ende schwarz. Beine bräunlichgelb, Schenkel unterseits braunpunctirt; Schienbeine am Grunde bräunlich; Schienbeinende, Klauenglied und Dorne — schwarz. L. 4 mm. (♂).

Все насекомое блѣднаго зеленоватожелтаго цвѣта съ чернымъ рисункомъ. Голова чернаго цвѣта, два большихъ полуovalныхъ пятна около глазъ, два другихъ въ передней части головы и конецъ носа свѣтложелтые; усики красноватые, первый суставъ у основанія имѣеть черное пятно, во-