

задней части *corium* и на вершинѣ бедръ находятся еще темнобурые волосы.

Экземпляръ этого вида былъ найденъ въ Хвалынскомъ уѣздѣ, Саратовской губерніи. *P. intermedius* относится къ той группѣ, въ которой принадлежать *P. vulneratus* Wolff. и *P. cognatus* Fieb. и по своимъ признакамъ долженъ помѣститься какъ разъ между ними.

6. *Agalliaster lucidus* n. sp. Bleich orangegeb, mit schwarzbraunen Borsten und gelblichem Schuppenhaar bekleidet. Halbdecken weisslich, fast durchsichtig, Membran bleich bräunlich. Zellrippen und Zellen weisslich. Fühler bleichgelblich, Fühlerglied 2 am Grunde, Glied 1 oben schwarz. Schenkel, besonders die hinteren, unterseits dicht schwarz gefleckt; Schienbeine oberseits mit einer Reihe schwarzer Punkte mit schwarzen Borsten. L.  $2\frac{1}{2}$  mm.

Весь однообразнаго блѣдно-желтоватаго цвѣта, съ слабымъ оранжевымъ оттѣнкомъ; надерья полупрозрачныя, бѣловатыя, перепонка блѣдно-буроватая; ребра ея влѣтокъ, равно какъ и пространство, заключенное въ нихъ — свѣтлѣе. Вся наружная сторона покрыта двумя родами волосковъ: одними, прилегающими, свѣтло-шелковистыми, въ видѣ чешуевъ; другими — весьма нѣжными стоячими — темно-бурого цвѣта. Глаза крупныя, темно-краснаго цвѣта. Усики блѣдножелтоватыя, основаніе втораго сустава и пятно на первомъ — чернаго цвѣта. На бедрахъ, особенно заднихъ, съ нижней ихъ стороны, расположены ряды крупныхъ черныхъ точекъ; такія же точки находятся и на наружной сторонѣ голеней; точки эти несутъ ряды черныхъ длинныхъ шиповъ.

Описываемый видъ стоитъ ближе всего къ *A. verbasci* H. Sff., отличаясь отъ него однообразнымъ цвѣтомъ туловища и полупрозрачными, безцвѣтными надерьями. У *A. verbasci* — нижняя сторона туловища чернаго цвѣта, а надерья имѣютъ буроватыя пятна. Одинъ экземпляръ этого