

ОПИСАНИЕ НОВЫХЪ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХЪ РУССКОЙ ФАУНЫ.

1. *Eusarcoris Putoni* n. sp. Der ganze Kopf, ein vier-eckiger Fleck in jedem Halswinkel des Pronotum, Schulterecke und die Bruststücke metallisch kupferroth. Oberseite mit metallischem Glanz. Rücken schwarz, mit gelblichem Mittelstreif; Connexivum schwarz, mit weisslichen Flecken. Bauchmitte mit dreieckigem, metallischschwarzem Fleck, und ein schwarzer Streif an der Seite. Bauchgrund, Bauchschiene 5 und Spiracula schwarz. Hinterleibrand weisslich mit schwarzem Fleck. Fühler hellbräunlich, abstehend weissbehaart, Glied 1, 2 und 3 von unten mit schwärzlichem Strich; Glied 3 doppelt länger als Fühlerwurzel, Glied 2 wenig kürzer als 3. Pronotum mit weisslichem, durchlaufendem Mittelkiel; Seitenrand des Pronotum weiss, kielförmig, vorn. Schulterecke spitz. Schildgrundwinkel schwarz; die kallosen Knoten klein, weiss. Membran bräunlich, mit sechs Rippen. Beine bräunlichgelb, schwarz punctirt; Schenkelende mit schwarzem Ring; Schienbeinende und Fussglieder braun. L. 10 mm.

Эта форма по своему *habitus* весьма напоминает *E. aeneus* въ значительно увеличенномъ видѣ; именно длина *E. aeneus* до конца перепонки равняется 6 — 7 миллим., а ширина, взятая между плечевыми углами — $4\frac{1}{2}$ — 5 мм., тогда какъ *E. Putoni* достигаетъ 10 мм. въ длину и 7 мм. въ ширину.

пляра не достаетъ 4 и 5 суставовъ) — по относительной длины суставовъ отличаются отъ остальныхъ видовъ *Eusarcoris*; именно 3 сустава у описываемаго вида вдвое длиннѣе первого и нѣсколько длиннѣе втораго тогда какъ у рода *Eusarcoris* вообще третій суставъ такъ коротокъ, что равенъ по длине лишь первому и значительно короче втораго. Впрочемъ, кроме отличія въ длине суставовъ усики, я не нашелъ болѣе такихъ рѣзкихъ признаковъ, основываясь на которыхъ, можно было бы отнести описываемый видъ къ особому роду. Усики свѣтлобуроватые, покрыты бѣловатыми стоячими волосками; вершины всѣхъ суставовъ, а равно полоска на нижней сторонѣ — темнобурья. Переднеспинка кпереди сильно суженная, вслѣдствіе глубокихъ выемокъ съ боковъ; передняя сторона глубоко вырѣзана для помѣщенія головы; шейные углы плотно прилегаютъ къ глазамъ; плечевые углы весьма вытанутые, острые; боковой каньтѣ бѣлаго цвѣта широкій, короткій, идущій отъ шейнаго угла только до расширенной части переднеспинки; вдоль послѣдней идетъ замѣтное, возвышенное ребро, въ передней своей части бѣлаго цвѣта. Основные углы щитка черные, съ небольшимъ голымъ бугоркомъ бѣлаго цвѣта, такой же бугорокъ помѣщается у основанія щитка, по срединѣ; передъ концомъ щитка, по бокамъ его, замѣтны два темныхъ, полуovalныхъ пятна; какъ щитокъ, такъ и переднеспинка покрыты частымъ и глубокимъ пунктиромъ, отдѣльныя точки котораго соединяются поперечными морщинками въ короткіе, неправильные, пересѣкающіеся ряды. Перепонка, выдающаяся надъ брюшкомъ, съ шестью буроватыми ребрами, изъ коихъ

нѣкоторыя съ отростками. Брюшко сверху черное, пятый сегментъ по заднему краю отороченъ широкой желтоватой полоской; такого же цвѣта полоска идеть вдоль всего брюшка по средней его линіи. *Connexivum* чернаго цвѣта; по срединѣ каждого сегмента, ближе въ верхнему углу, находится полукруглое бѣловатое пятно. Брюшко снизу очень выпуклое, съ тремя буровато-черными полосками, отливающими слабымъ металлическимъ блескомъ, первый сегментъ брюшка, также какъ и пятый, почти сплошь чернаго цвѣта, кромѣ боковыхъ краевъ; брюшко, за исключениемъ средины, покрыто грубымъ пунктиромъ, точки котораго на свѣтлыхъ частяхъ брюшка — буроватыя; дыхальца черныя; боковые края брюшка бѣлые съ черными пятнами во вѣнчихъ углахъ сегментовъ. Ноги буровато-желтые, покрытыя черными точками; передъ концомъ бедра задней пары — черное кольцо; на двухъ переднихъ пахахъ кольца неполные, въ видѣ болѣе или менѣе развитыхъ пятенъ на передней сторонѣ бедръ; концы голеней и всѣхъ суставовъ лапокъ, также какъ и кончики когтей — бураго цвѣта. Второй суставъ хоботка вдвое длиннѣе первого, третій и четвертый коротки, каждый короче 2-го; послѣдній изъ нихъ чернаго цвѣта.

Одинъ экземпляръ этого вида былъ полученъ мною, чрезъ посредство С. М. Сольского, изъ окрестностей Албазина, на Амурѣ.

Macrorhamphus n. g. Körper gestreckt, lânglich. Kopf sehr gross, gestreckt, fünfeckig. Schnabel die dritte Bauchschiene erreichend; Schnabelwurzel so lang als der Unterkopf; Glied 2 und 3 die längsten. Fühlerwurzel halb so lang als der Kopf, Glied 2 an $2\frac{1}{2}$ Mal länger als 1, Glied 3 an $\frac{3}{4}$ von 2; Glied 4 spindelig, so lang als 3. Augen gross, vorstehend, vom Pronotum entfernt. Pronotum trapezförmig, so lang als hinten breit, vorn verschmäleret und mit zwei querliegenden S-förmigen Furchen. Schild kurz, stumpf. Vorderschenkel nicht stark,

unterseits mit zwei grossen, voran mit zwei kleineren Stacheln. Hinterfusswurzel so lang als Glied 2 und 3 zusammen. Bauch mit flacher Rinne. Membran mit vier Rippen, die zwei inneren am Grunde zu einer Zelle verbunden.

Родъ этотъ относится къ группѣ *hygaeodae* и по своимъ признакамъ долженъ стоять рядомъ съ р. *Caenocoris*.

Головка очень большая, равная длиною переднеспинѣ; ширина головы, взятая съ глазами вмѣстѣ, на $\frac{1}{4}$ часть короче своей длины. Глаза большие, выпуклые, почти полушарообразной формы, нѣсколько отстоящіе отъ края переднеспинки. На затылкѣ, вдоль внутренняго края глаза проходитъ линейная бородка. Конецъ носа вытянутый. Усики умѣренной длины, первый суставъ на половину короче головы и не выдается передъ носомъ, такъ что вершины его и конецъ носа приходятся на одной линіи. Второй суставъ усиковъ, также и третій, — тонкій, въ два съ половиною раза длиннѣе первого; третій на $\frac{1}{4}$ короче втораго; послѣдній суставъ веретенообразный, равный по длини третьему. Хоботокъ весьма длинный, достигающій почти до половины третьаго брюшнаго кольца; первый суставъ его равенъ длиною головѣ, 2 и 3 по длини между собою равны и каждый изъ нихъ въ полтора раза длиннѣе первого. Переднеспинка трапециoidalной формы, впереди значительно суженная; въ передней ея части находятся парные углубленныя бороздки, въ видѣ буквы S (какъ и у всей группы *hygaeodae*). Щитокъ короткій, тупой, широкозакругленный на концѣ; боковой его край короче основнаго. Перепонка съ 4 ребрами, изъ которыхъ два первыхъ, внутреннихъ образуютъ въ основаніи своею замкнутую клѣтку. Бедра переднихъ ногъ слабо утолщены; съ нижней стороны ихъ, по внутреннему краю, расположены два сильныхъ, острыхъ шипа, въ нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга; между первымъ шипомъ и вершиной бедра сидятъ еще два небольшихъ, острыхъ зубчика. Первый суставъ лапокъ задней пары равенъ по дли-

нѣ остальными двумъ суставамъ. Первыя два кольца брюшка снизу имѣютъ продольную, широкую, но неглубокую бороздку.

Признаки этого рода очень сходны съ признаками р. *Caenocoris*, но первый, легко отличается отъ послѣдняго своею большою головою и болѣе сильнымъ вооруженiemъ передней пары ногъ.

2. *M. Caucasicus* n. sp. Ganz schmutziggelblich, fein abste-hend weiss behaart. Kopf, Halbdecken und Hinterleib braunröhlich. Pronotum hinten zerstreut punctirt. Kopf im Nacken und von unten, Schild am Grunde, und Bruststücke — schwarz. Membran bräunlich. Schenkel schmutziggelb, am Ende bräunlich. ♂ 6 $\frac{1}{2}$ —7 mm.

Туловище сверху и надкрылья покрыты довольно густо вѣсмь нѣжными, стоячими волосками — бѣловатаго цвѣта. Все наскѣкомое сверху грязнаго-желтоватаго цвѣта, надкрылья съ красноватымъ оттѣнкомъ, а ноги — нечисто-бѣлаго цвѣта. Усики свѣтло-рыжіе, вершина основнаго сустава и весь послѣдній буроватые. Голова красновато-рыжая, бока ея кругомъ глазъ и продольная окологлазная бороздка — черныя. Глаза вишнево-чернаго цвѣта. Переднеспинка свѣтлая, желтовато-бѣлая, въ задней своей части слегка возвышенная и покрытая довольно сильнымъ пунктиромъ, точки котораго неправильной формы, не глубоки и рѣдко раскиданы; передняя часть переднеспинки и поперечные, изогнутыя бороздки на ней также красновато-рыжаго цвѣта, какъ и голова; вдоль всей переднеспинки, по ея срединной линіи идетъ полоска чернаго цвѣта; такого же цвѣта полоска идетъ и по заднему краю *pronotum'a*. Въ основаніи щитка помѣщается черное, трехугольное пятно. Надкрылья въ передней своей части грязновато-желтаго цвѣта, въ задней же половинѣ, особенно ближе къ перепонкѣ, принимаютъ красноватый оттѣнокъ. Перепонка свѣтло-бурая, съ слабымъ металлическимъ отливомъ и многочисленными поперечными, неправильными

струйками, между ребрами. Хоботок светло-рыжеватый, по-слѣдній суставъ его темнобурый. Голова снизу, средне- и заднегрудь, окраины первыхъ трехъ брюшныхъ сегментовъ — черного цвѣта. Брюшко красновато-рыжее, *connexivum* светлѣе, съ темными пятнами въ заднихъ углахъ. Ноги грязно-блѣловато-желтые, конецъ бедръ съ буроватыми, широкими пятнами, когтевой суставъ лапокъ — бураго цвѣта. Дл. $6\frac{1}{2}$ — 7 мм. (♂). Дербентъ (Христоффъ).

Судя по неопределеннымъ и слабо выраженнымъ цвѣтамъ описываемаго вида, можно предположить, что я имѣлъ дѣло съ экземплярами не вполнѣ зрѣлыми.

Stenocarenum n. g. Körper lânglich, gestreckt, kahl. Kopf schmal, viel lânger als im Nacken breit. Augen ziemlich gross, halbkugelig, dem Pronotum anliegend. Schnabelwurzel fast so lang als der Kopf, Glied 4 das Ende der Mittelbrust erreichend. Fühler stark, Wurzelglied mit seiner Hâlfte den Kopf überragend; Glied 2 über $2\frac{1}{4}$ mal lânger als 1, Glied 3 an $\frac{4}{5}$ von 2, Glied 4 gleichlang dem 3. Pronotum schmal, trapezförmig, sehr gestreckt (doppelt so lang als breit), vorn wenig verschmäler, hinten kaum niedergedrückt. Pronotum-Seiten fein geschweift, mit stumpfem Kiel. Schild lang, spitzig. Halbdecken nicht vollkommen, mit rudimentärer Membran. Vorderschenkel sehr stark, breit, mit drei grossen, voran mit einigen kleineren Stacheln. Vorderschienbeine $\frac{2}{3}$ des Schenkels lang, bogig. Hinterfusswurzel fast zweimal lânger als Glied 2 und 3 zusammen.

Описываемый родъ принадлежитъ къ группѣ *Megalomoitidae*. Туловище длинное, вытянутое, снабженное массивными уси-ками и весьма толстыми, расширенными бедрами передней пары ногъ. Голова сравнительно небольшая, узкая, съ силь-но выдающимся носомъ. Глаза довольно крупные, выпуклые, полушаровидной формы, прилегающіе къ шейному углу пе-реднеспинки; простые глазки (*ocelli*) весьма малые. Усики

большіе, массивные; первый суставъ ихъ на половину короче головы, но значительно выдается передъ носомъ; второй суставъ, постепенно утолщающійся къ вершинѣ, нѣсколько болѣе, чѣмъ вдвое длиннѣе первого; третій — такой же формы какъ второй, едва его короче, а послѣдній веретенообразный, почти равный по длини третьему. Вершины 1, 2 и 3 суставовъ съ внутренней стороны оканчиваются пучкомъ щетинокъ. Хоботокъ короткій, едва достигающій до среднегруди; первый суставъ его почти равный по длини 2 и 3 въ отдельности, едва короче головы и толще прочихъ; послѣдній суставъ почти на половину короче третьаго. Переднеспинка узкая и весьма удлиненная, вдвое длиннѣе головы; спереди сужена и закруглена, а въ задней части, между плечевыми углами, незначительно расширена; боковые края ея слегка выпуклы, а передъ плечевыми углами находится пологая выемка. Задній край дугообразно вырѣзанъ, причемъ возвышенные плечевые углы нѣсколько прикрываютъ основанія надкрыльевъ. Передній край прямой, ограниченный неяснымъ кантомъ. Боковой край также обведенъ тупымъ ребромъ, совершенно незамѣтнымъ, если смотрѣть сверху, съ нижней же стороны отдаленнымъ линейной бородкой. Длина переднеспинки вдвое превышаетъ ея ширину; задняя четверть ея слегка придавлена и пунктирована, передняя же большая доля — представляетъ незначительную выпуклость. Щитокъ длинный, узкій, заостренный; боковой край его въ полтора раза длиннѣе основнаго. Надкрылья съ укороченными перепонкою; вдоль *clavus* проходитъ до пяти правильныхъ рядовъ точекъ; на *corium* правильные ряды точекъ идутъ только по сторонамъ внутренняго ребра, въ остальныхъ же мѣстахъ, особенно передъ перепонкой, точки расположены безъ всякаго порядка; вдоль главнаго ребра, замѣтнаго только до половины длины *corium*, съ вѣшней его стороны, также идетъ рядъ точекъ; край *corium'a* въ задней половинѣ гладкій. Перепонка недоразвита, неясно разграни-

ченная отъ *corium*. Бедра передней пары ногъ чрезвычайно утолщены и съ нижней стороны сильно вооруженны; по внутреннему краю ихъ проходитъ цѣлый рядъ зубчиковъ разнообразной величины, именно: у вершины бедра расположены шесть мелкихъ, острыхъ зубчиковъ въ видѣ гребня, тотъ часъ же за ними сидитъ длинный, острый шипъ, затѣмъ дальше, въ равномъ разстояніи другъ отъ друга, помѣщаются еще два шипа, каждый на половину короче предыдущаго; кромѣ того сзади первого длинного шипа сидитъ еще небольшой зубчикъ. Голени переднихъ ногъ гладкія, сильно изогнутыя и къ концу значительно расширяющіяся. Первый суставъ лапокъ задней пары ногъ въ полтора раза длиннѣе остальныхъ двухъ суставовъ.

3. *S. vulsus* n. sp. Körper schwarz, matt, kahl. Tylus, Schnabel und Beine bräunlich gelb. Halbdecken braunroth mit schwarzem viereckigem Fleck im Innenwinkel des Corium. Fühler schwarz, Fühlerwurzel und Endglied — bräunlich, Glied 2 und 3 dicht, fein behaart. L. $7\frac{1}{2}$ mm. (♂)

Голова и все туловище матовочернаго цвѣта; конецъ носа, хоботокъ (кромѣ послѣдняго сустава) и ноги рыжевато-бураго цвѣта; надкрылья красноватобурны; вдоль *clavus* замѣтна черта чернаго цвѣта; черное же круговое пятнышко помѣщающееся въ углу между главнымъ и внутреннимъ ребрами и наконецъ большое четырехугольное пятно такого же цвѣта помѣщающееся во внутреннемъ углу надкрыльевъ. Основной суставъ усиковъ — бурый, съ нижней стороны рыжій, 2 и 3 суставы черные, густо покрытые весьма нѣжными буроватыми волосками; послѣдній суставъ рыжеватый, съ чернымъ основаниемъ, покрытый длинными тонкими волосками желтоватаго цвѣта. Видъ этотъ найденъ около Дербента г. Беккеромъ.

Drymocoris n. g. Körper lânglichoval. Kopf klein, so lang als breit. Wangenplatten sehr klein, vorn. Fühlerwurzel so lang

als der Kopf, mit der Hälften denselben überragend; Glied 2 doppelt länger als 1, Glied 3 gleichlang mit 4. Schnabel an das Ende der Mittelbrust reichend; Schnabelwurzel wenig kürzer als der Kopf. Augen halbkugelig, vorstehend. Pronotum trapezförmig, breiter als lang; der Seitenrand leicht geschweift, mit deutlichem, blattartigem Kiele. Pronotum - Mitte querüber eingedrückt. Membran mit vier Rippen. Vorderschenkel unbewehrt, mit zwei Borsten an der unteren Kante. Hinterfusswurzel fast länger als Glied 2 und 3 zusammen.

Голова небольшая, почти въ половину короче переднеспинки; ширина ея, взятая вмѣстѣ съ глазами, равняется длини. Усики длинные, волосистые; первый суставъ почти равенъ по длини — головѣ и на половину выдается передъ концомъ носа; второй суставъ вдвое длиннѣе перваго; 3-й и 4 суставы равной длины, каждый изъ нихъ на $\frac{1}{5}$ часть короче втораго; вообще суставы усиковъ тонкіе, цилиндрическіе, въ вершинѣ слабо расширяющіеся, кромѣ послѣдняго, который веретенообразный. Хоботокъ тонкій, саблевидноизогнутый, достигающій до заднегруди; первый суставъ его равенъ длиною головѣ, второй длиннѣе прочихъ, третій равенъ первому. Висцы очень короткіе, сидящіе впереди. Глаза выпуклые, полушаровидные, нѣсколько отстоящіе отъ переднаго края переднеспинки. Послѣдняя трапециoidalной формы, нѣсколько болѣе развитая въ ширину, чѣмъ въ длину; передній край ея уже заднаго, глубоковыемчатый; задній край почти прямой, у плечевыхъ угловъ широко закругленный и значительно вздутый; боковые края съ узкой, листоватой оторочкой, слегка вогнутые по срединѣ и закругляющіеся кпереди. Переднія двѣ трети переднеспинки выпуклыя, съ слабымъ углубленіемъ на срединной линіи, заднія треть приплюснутая, грубо пунктирована и отдѣлена отъ передней доли широкой, но не очень рѣзкой бороздкой. Щитокъ длинный, заостренный, боковой край его прямой и едва длиннѣе

переднаго; основание щитка возвыщено и ограничено съ боковъ ребрами, которые сливаются по срединѣ въ одно сильное ребро, доходящее до остряя щитка. Надкрылья вполнѣ развитыя, перепонка небольшая, у ♀ короче брюшка, съ четырьмя ребрами, изъ которыхъ два крайніе слабо выражены. Боковыя части груди покрыты сильными, рѣдкими точками; брюшко довольно толстое, вздутое. Ноги длинныя; бедра передней пары слабо угленищены и невооружены зубцами; на переднемъ концѣ ихъ съ нижней стороны находятся только двѣ длинныя щетинки, сидящія на возвышенномъ основаніи. Голени переднихъ ногъ прямыя, къ концу слабо расширяющіяся. Лапки задней пары ногъ длинныя: первый суставъ ихъ почти вдвое длиннѣе остальныхъ двухъ.

4. *D. gibbosus* n. sp. Kopf, Pronotum und Schild dunkelbraun, glänzend und sehr zerstreut borstig behaart; Halbdecken und Unterseite matt. Randkiel des Pronotum, Beine, Fühler, Schildende und Halbdecken — hellbraun; Hinterleib röthlichbraun. Membran rauchbraun, Rippen bisweilen schmutziggelblich. Pronotum vorn mehr gewölbt, hinten grob punctirt. Brust und Schild ebenso punctirt. Halbdecken - Rand fein abstehend behaart. L. $4\frac{1}{2}$ — 5 mm. (♀)

Голова, переднеспинка и щитокъ блестящіе, покрытые длинными, очень нѣжными щетинками, весьма рѣдко разбросанными. Надкрылья и нижняя сторона туловища — матовыя. Голова и туловище темнобураго цвѣта, брюшко съ краснобурымъ оттенкомъ; усики, хоботокъ, ноги, надкрылья, килеватые боковые края переднеспинки, а также окраины и конецъ щитка — свѣтлобурыя. Перепонка сплошь дымчатаго цвѣта съ выпуклыми ребрами, которые бываютъ иногда свѣтлѣе общаго цвѣта; края надкрыльевъ оторочены рядомъ очень нѣжныхъ, короткихъ щетинокъ. Наиболѣе крупный пунктиръ находится на задней части переднеспинки, только выпуклые плечевые углы и очень узкая полоска по заднему краю

свободны отъ точекъ; самыя точки пунктира имѣютъ видъ глубокихъ, продольныхъ черточекъ. Части груди снизу все покрыты точками, нѣсколько рѣже расположеными, менѣе глубокими и обыкновенной формы. Очень грубый пунктиръ находится также по бокамъ щитка, особенно къ его концу, только высокое и острое ребро щитка совершенно гладкое; возвышенная, основная часть щитка покрыта болѣе нѣжными и рѣдкими точками. Вдоль *clavus* и *corium* идетъ по пяти правильныхъ рядовъ точекъ; главное ребро очень высокое, идетъ близко къ боковому краю, который совершенно гладкій. Вдоль надкрыльевъ также проходитъ гладкая полоска, расширяющаяся внизу, которая нѣсколько темнѣе общаго цвѣта тѣла. Голени покрыты очень нѣжными волосками и кроме того имѣютъ съ внутренней стороны рядъ рѣдкихъ щетинокъ. Самецъ неизвѣстенъ, ♀ достигаетъ $4\frac{1}{2}$ — 5 мм. Два экземпляра этого вида было открыто С. М. Сольскимъ въ Лужскомъ уѣзде, С.-Петербургской губерніи.

5. *Poeciloscytus intermedius* n. sp. Blassgrünlichgelb, fein silberweiss behaart. Fühler röthlich, Wurzelglied am Grunde und Ende mit schwarzem Ring. Kopf, vier Streifen auf dem Pronotum, Schild, Mitte der Vorder- und Mittelbrust schwarz, zwei Flecke vorn am Kopfe, Tylus und Schildspitze gelb. Halbdecken bräunlichgelb, Randlinie des Corium schwärzlich. Im Clavus drei, im Coriumende zwei Streifen bräunlich. Cuneus blutroth, am Rande schwarz; Grund und Spitze gelblich. Rücken grünlich, Ende schwarz. Beine bräunlichgelb, Schenkel unterseits braunpunctirt; Schienbeine am Grunde bräunlich; Schienbeinende, Klauenglied und Dorne — schwarz. L. 4 mm. (♂).

Все насекомое блѣднаго зеленоватожелтаго цвѣта съ чернымъ рисункомъ. Голова чернаго цвѣта, два большихъ полуovalныхъ пятна около глазъ, два другихъ въ передней части головы и конецъ носа свѣтложелтые; усики красноватые, первый суставъ у основанія имѣеть черное пятно, во-

торое съ внутренней стороны продолжается иногда въ полоску, доходящую до вершины сустава, которая имѣть снизу также черное пятно въ видѣ полукольца. Первые два сустава хоботка — зеленоватые, третій рыжеватый, четвертый весь и основаніе третьаго — чернаго цвѣта. Переднеспинка зеленоватожелтая съ четырьмя черными, продольными полосами, не доходящими до задняго края; одна пара полосъ идетъ по боковымъ краямъ переднеспинки, постепенно расширяясь въ плечевые угламъ; вторая, внутренняя пара полосъ лежитъ по сторонамъ срединной линіи. Щитокъ черный, конецъ его желтый (какъ у *P. cognatus*). Надкрылья буровато-желтый, наружная линія ихъ черноватая; окраины *clavis* и одна полоска вдоль его — бураго цвѣта; такія же двѣ полоски находятся въ задней половинѣ *corium*; основаніе и конецъ *cuneus* желтоватые, центръ его занятъ кровяно-краснымъ пятномъ трехугольной формы съ округленными концами; наружный край *cuneus* чернаго цвѣта. Перепонка свѣтлая, прозрачная, ребра ея желтые; внутри большой, мембранныальной клѣтки помѣщается кольцо буроватаго цвѣта; такое же кольцо окружаетъ обѣ клѣтки и съ наружной стороны; въ малой клѣткѣ средина буроватая. Спина зеленоватая, кромѣ предпослѣдняго сустава, который чернаго цвѣта. Брюшко снизу и части груди съ боковъ однообразного зеленовато-желтаго цвѣта; средина переднегруди и особенно среднегруди — чернаго цвѣта. Ноги буровато-желтые, къ основанію свѣтлѣ; на бедрахъ, съ нижней ихъ стороны, расположены въ два ряда бурыя точки; у вершины бедръ онѣ сосредоточены гуще, безъ всякой правильности и образуютъ пятно въ видѣ полукольца; голени у основанія имѣютъ иногда буроватое пятно снизу, или кольцо; конечный край голеней, также какъ весь когтевой суставъ лапокъ чернаго цвѣта; шипики, находящіеся на голеняхъ — черные, не имѣющіе у основанія темныхъ точекъ, или пятенъ. Туловище сверху и снизу покрыто сѣребристыми, прилегающими волосками; кромѣ того на

задней части *corium* и на вершинѣ бедръ находятся еще темнобурые волоски.

Экземпляръ этого вида былъ найденъ въ Хвалынскомъ уѣздѣ, Саратовской губерніи. *P. intermedius* относится къ той группѣ, въ которой принадлежать *P. vulneratus* Wolff. и *P. cognatus* Fieb. и по своимъ признакамъ долженъ помѣститься какъ разъ между ними.

6. *Agalliaster lucidus* n. sp. Bleich orangegelb, mit schwarzbraunen Borsten und gelblichem Schuppenhaar bekleidet. Halbdecken weisslich, fast durchsichtig, Membran bleich bräunlich. Zellrippen und Zellen weisslich. Fühler bleichgelblich, Fühlerglied 2 am Grunde, Glied 1 oben schwarz. Schenkel, besonders die hinteren, unterseits dicht schwarz gefleckt; Schienbeine oberseits mit einer Reihe schwarzer Puncte mit schwarzen Borsten. L. $2\frac{1}{2}$ mm.

Весь однообразнаго блѣдно-желтоватаго цвѣта, съ слабымъ оранжевымъ оттенкомъ; надкрылья полупрозрачныя, блѣдоватыя, перепонка блѣдно-буроватая; ребра ея блѣтокъ, равно какъ и пространство, заключенное въ нихъ — свѣтлѣе. Вся наружная сторона покрыта двумя родами волосковъ: одними, прилегающими, свѣтло-шелковистыми, въ видѣ чешуекъ; другими — весьма нѣжными стоячими — темно-бураго цвѣта. Глаза крупные, темно-краснаго цвѣта. Усики блѣдно-желтоватые, основаніе втораго сустава и пятно на первомъ — чернаго цвѣта. На бедрахъ, особенно заднихъ, съ нижней ихъ стороны, расположены ряды крупныхъ черныхъ точекъ; такія же точки находятся и на наружной сторонѣ голеней; точки эти несутъ ряды черныхъ длинныхъ шиповъ.

Описываемый видъ стоитъ ближе всего къ *A. verbasci* H. Sff., отличаясь отъ него однообразнымъ цвѣтомъ туловища и полупрозрачными, безцвѣтными надкрыльями. У *A. verbasci* — нижняя сторона туловища чернаго цвѣта, а надкрылья имѣютъ брововатыя пятна. Одинъ экземпляръ этого

вида былъ найденъ г. Христофоромъ въ Казумкентѣ (на Кавказѣ).

7. *Salda halophila* n. sp. Kopf schwarz, sehr fein silberweiss behaart. Fühler weisslich, Glied 1 und 2 unterseits mit schwarzem Strich, Glied 3 und 4 ganz bräunlich. Pronotum quer trapezförmig, breiter als in der Mitte, lang, schwarz, glänzend. Pronotum-Seiten weiss, die Zeichnung nach hinten erweitert. Schild schwarz, am Grunde matt. Halbdecken grob punctirt, schwarz, fein behaart; Corium und Clavus schwarz, Ende weiss; Corium im Randfelde am Grunde und ein Fleck im Innenwinkel weisslich. Beine schmutzigweiss. L. 4—4½ mm. ♂, 5 m. ♀.

Видъ этотъ принадлежитъ къ немногочисленной группѣ, имѣющей боковыя стороны переднеспинки бѣлаго цвѣта. По своей волосистой наружности видъ этотъ походитъ на *S. pilosa* Fall., встрѣчающейся въ Швеціи и Германіи, но отличается отъ него нѣкоторыми особенностями.

Голова сверху и снизу чернаго цвѣта, покрытая весьма нѣжными, серебристыми волосками; между сложными и простыми глазами помѣщается круглое, выпуклое бѣлое пятнышко, съ длинной черной щетинкой; пара бѣлыхъ бугорковъ съ такой же щетинкой находится еще на лбу, между передними краями глазъ. Конецъ носа (*tylus*) и двѣ пары бугорковъ, сидящихъ передъ глазами и между усииками — бѣловатые. Хоботокъ, за исключеніемъ первого сустава, черный. Усики желтовато-бѣлые, послѣдніе два сустава буроватые; 1 и 2 суставы имѣютъ снизу черную продольную полоску. Всѣ усики, кроме втораго сустава, покрыты длинными, очень рѣдко раскиданными щетинками. (Цвѣтъ головы и ея придатковъ очень постояненъ и остается неизмѣняемымъ у всѣхъ разновидностей.) Переднеспинка блестящаго чернаго цвѣта, безволосая; боковые края ея бѣлые; бѣлый цвѣтъ иногда проходитъ узкимъ ободкомъ по краю переднеспинки, чаще же расширяется передъ плечевыми угломъ въ большое трехуголь-

ное пятно. Щитокъ чернаго цвѣта, основная широкая его половина — матовая, отъ весьма мелкаго, струйчатаго пунктира, а конечная доля гладкая, блестящая; у свѣтлыхъ экземпляровъ вся эта половина щитка бываетъ часто бѣлаго цвѣта, кромѣ острея, которое остается чернымъ. Надкрылья покрыты сплошь грубымъ, частымъ пунктиромъ, особенно развитымъ на *clavis* и чёрными, прилегающими волосками. Надкрылья чернаго цвѣта; широкая бѣлая полоса идетъ по ихъ боковому краю нѣсколько далѣе половины надкрыльевъ; конецъ *clavis*, круглое пятнышко во внутреннемъ углу надкрыльевъ и большое пятно на концѣ *corigum* — бѣлаго цвѣта. Иногда надкрылья вмѣстѣ съ перепонкой бываютъ сплошь грязновато-бѣлаго цвѣта и тогда пунктиръ на нихъ гораздо нѣжнѣе; между надкрыльями чернаго и бѣлаго цвѣта встрѣчаются всевозможные переходы. Туловище снизу чернаго цвѣта; передній и задній край переднегруди, окраины брюшныхъ колецъ и послѣдній генитальный сегментъ брюшка — бѣлаго цвѣта; у свѣтлыхъ экземпляровъ брюшко бываетъ почти сплошь молочно-бѣлаго цвѣта.. Ноги грязновато-бѣлые, бедра имѣютъ съ нижней стороны рядъ буроватыхъ точекъ; концы голеней и когтеваго сустава и рѣдкія щетинки, покрывающія голени двухъ заднихъ паръ ногъ — чернаго цвѣта; бедра густо покрыты короткими, бѣлыми волосками. Заднія голени изогнуты.

Найдены были мною во множествѣ на полуостровѣ Манышлакѣ, по берегамъ солинныхъ озеръ. Около Баку находилъ этотъ видъ г. Христоффъ.

8. *Nabis Reuteri* n. sp. Grauweissgelblich. Kopf unterseits, Brust und Hinterleib schwarz; Vorderrand der Vorderbrust weissgelblich. Connexivum gelblich mit schwarzen Flecken. Fühler gelbbraunlich; Fühlerwurzel fast so lang als der Kopf, und $1\frac{1}{2}$ Mal kürzer als Glied 2; Glied 3 gleichlang dem 2. Halbdecken den Hinterleib bedeutend überragend, vollkommen ausgebildet. L. 7 mm.

Приналежить къ группѣ видовъ, имѣющихъ на *connexivum* черные пятна, куда изъ формъ русской фауны относится только *N. marginerunctatus* Jakowl. (*N. Sareptanus* Drn.).

Продолговатоovalный, къ заду болѣе расширенный. Голова узкая, вытянутая, немножко короче переднеспинки, снизу черная, покрытая густымъ серебристымъ пухомъ; на головѣ сверху находится черное продолговатое пятно. Первый суставъ усиковъ длинный, едва короче головы и лишь на $\frac{1}{3}$ короче втораго сустава, который равенъ третьему (у *N. marginerunctatus* — первый суставъ усиковъ короткий, на половину короче втораго, который значительно длиннѣе третьаго; по этому признаку *N. marginerunctatus* и *N. Reuteri* — очень рѣзко отличаются между собою). Грудь, а также брюшко сверху и снизу черного цвѣта, кроме широкихъ окраинъ переднегруди, которыхъ блловатого цвѣта и послѣдняго генитальнаго сегмента брюшка, который буроватого цвѣта. Усики однообразнаго рыжевато-бураго цвѣта. Надкрылья гораздо длиннѣе брюшка; *connexivum* съ черными пятнами въ переднихъ углахъ сегментовъ, значительно выдается изъ подъ надкрыльевъ. Общий цвѣтъ поверхности насѣкомаго какъ у *N. ferus*. Ноги сильныя, бедра передней пары съ рѣзкими поперечными черными полосками и пятнами; остальные ноги также покрыты черными пятнами, а конецъ бедра задней пары ногъ — имѣть темное кольцо. Конецъ послѣдняго сустава лапокъ и когти — черноватые. Самецъ неизвѣстенъ, равно какъ и форма съ укороченными надкрыльями. Длина до конца надкрыльевъ 7 мм.

Окрестности Албазина на Амурѣ. Одинъ экземпляръ этого вида полученъ мною черезъ посредство С. М. Сольского.

В. Яковлевъ.

Астрахань.
Апрѣль 1875.