

2. *Calocore bipunctué*, *Calocoris bipunctatus*. Fabr.
—Reut. Hem. Gymn. Scand. et Fenn. p. 37. (Pl. III, Fig. 7).

Long. .26 pce. Jaune-verdâtre avec teinte verte plus prononcée sur le disque du thorax et les élytres. Antennes avec le 1er article moins de la moitié du 2e, celui-ci obscur à l'extrémité. Thorax et élytres sans punctuations, mais avec poils couchés nombreux ; le pronotum avec une ligne enfoncée transverse vers le milieu, en arrière de laquelle se voit un gros point noir ou brun de chaque côté de la ligne médiane. Elytres avec la membrane un peu enfumée, les cellules circonscrites par une ligne claire. Dessous et pattes sans aucune tache.—CapRouge ; peu commun.

Capturé à St-Hyacinthe, au Cap-Rouge etc. Quelquefois les élytres sont lavées de rouge-sanguin, alors les cellules de la membrane sont entourées d'une ligne rouge ; mais les 2 points noirs du thorax suffisent toujours pour distinguer cette espèce.

11. Gen. PYCNOPTERNE. *Pycnopterna*, Fieb.

(De *puknos*, épais et *pterna*, talon).

Tête triangulaire en dessus ; yeux très rapprochés du pronotum, celui-ci en forme de cloche, fortement rétréci en avant avec un petit rebord au sommet. Le cou arrondi et sans rebord ; la callosité du front courbée en arc. Antennes à premier article plus court que le pronotum, le 2e plus long, cylindrique. Elytres à côtés subparallèles. Pattes ordinaires.

Une seule espèce rencontrée à Ottawa, et que nous croyons nouvelle.

Pycnopterne agréable. *Pycnopterna amœna*, n. sp.

Long. .32 pce. Brune variée de jaune. La tête noire, brillante, avec une ligne orbitale pâle en dedans des yeux atteignant le vertex. Chaperon saillant et prolongé en avant. Yeux finement granulés, non contigus au pronotum. Pronotum fortement rétréci en avant en forme de cloche, sans callosités distinctes en avant, finement rugueux en arrière, les côtés régulièrement sinués, le bord postérieur arrondi et légèrement sinué au milieu, la moitié