

élytres plus claires à l'extrémité, la membrane fortement obscure. Pattes avec les jambes roussâtres, munies d'épines noires, brunes à l'extrémité.

Forme brachyptère ♀ : Largement ovale, les élytres atteignant à peine le milieu du dos, sans membrane.

VAR.—Vertex avec une tache jaunâtre de chaque côté.

Rare ; se trouve d'ordinaire sur la *Vicia cracca*. Cet insecte est commun à l'Europe et à l'Amérique.

28 Gen. *Chlamydate*. *Chlamydatus*, Curt.

(*Chlamydatus*, qui porte un capot).

Corps allongé, le plus souvent noir. Tête courte en avant, comprimée, verticale, faiblement plus étroite que la base du pronotum, à angle facial aigu. Front net, glabre. Antennes insérées au sommet des yeux. Yeux grands, lisses, contigus au pronotum, non échancrés intérieurement. Pronotum en trapèze, échancré à la base, sans stricture apicale ni impression transversale, les callosités peu distinctes. Elytres incomplètes souvent dans la ♀, rarement dans le ♂ ; ailes sans hamus. Pattes longues, avec les cuisses renflées, les jambes finement spinuloses. Tarses à second article plus long que le premier. Aréoles grandes, conniventes.

Une seule espèce rencontrée.

Chlamydate en-deuil. *Chlamydatus luctuosus*, n. sp.

♂—Long. .19 pce. Noir, poli, brillant, avec les pattes jaunes et les élytres pellucides. Tête courte, peu saillante en avant des yeux, ceux-ci débordant le pronotum. Antennes velues, noires, à premier article aussi long que la largeur de la tête, le 2e d'égale grosseur dans toute sa longueur, le 3e plus grêle, mais à peu près aussi long que le 2e. Pronotum sans ponctuations, les côtés légèrement sinués. Elytres pellucides, à côtés parallèles, à fracture du coin profonde, le bord intérieur avec la marge extérieure du coin et la pointe, brun plus ou moins foncé, la membrane plus claire, aréoles grandes, parallèles avec le bord latéral de l'élytre, atteignant l'extrémité du coin. Abdomen noir, plus