

**Macrocole coagulé.** *Macrocoleus coagulatus*, Uhl.

*Macrocoleus coagulatus*, Uhl.—Bull. Geol. Surv. p. 417.

Long. .18 pce. Vert-pomme, la couleur sur le pronotum et les élytres paraissant comme coagulée, laissant des taches nues sur le fond. Tête transverse, vert pâle, à pubescence blanchâtre, la base avec une carène transverse échancrée au milieu. Antennes jaunâtres, le 2e article 3 fois la longueur du premier, d'égale grosseur dans toute sa longueur. Rostre dépassant les hanches intermédiaires, vert à la base, jaune au milieu et noir à l'extrémité. Yeux bruns, ovales, sub-réniformes, obliques. Pronotum transverse, jaunâtre à taches vertes, avec pubescence blanche, les callosités grandes, séparées au milieu, la base large avec, sa marge très anguleuse à l'épaule, les côtés oblique avec les bords carénés. Elytres vertes, à taches jaunâtres, la membrane hyaline avec une tache obscure vers le sommet, une autre tache obscure à la rencontre des nervures et une tache plus foncée au bout de l'aréole. Pattes pâles, d'un vert jaunâtre, l'extrémité des jambes et des tarsi obscure. Ecusson vert-pâle, lisse, faiblement convexe. Abdomen vert-pâle.—CapRouge. Rare.

37. Gen. AMBLYTYLE. *Amblytylus*, Fieb.

(De *ambly*, grand *tylè* bosse, chaperon).

Corps oblong, opaque. Tête plus longue que large, prolongée en rostre; vertex non marginé, chaperon vu de côté, fortement arqué, gros, très proéminent; joues petites. Rostre long, dépassant les hanches postérieures. Antennes à article basilaire dépassant peu le chaperon. Pronotum en trapèze, ses bords latéraux distinctement marginés en avant. Mésosternum tronqué au sommet. Pattes avec les cuisses postérieures non ou à peine renflées; jambes finement spinuloses. Ongles médiocres, bifides.

Vivent sur les herbes. Une seule espèce rencontrée.

**Amblytyle à six-points-blancs.** *Amblytylus 6-guttatus*, n. sp.

Long. .13 pce. D'un noir opaque velouté. Corps en ovale