

In parœcia Kivinebb d. 19 Aug. unicum specimen inveni.
(In parœcia Pargas a O. Reuter etiam captus.)

* 101. *Plagiognathus pallidipennis* nov. sp.

Oblongo-ovatus, niger, nitidus; antennis, rostro, basi apiceqve excepto, pedibus cum coxis hemielytrisqve pallide flavis, corio tenuissime pallide pubescente, margine laterali versus apicem late, parteqve posteriore cunei, fulvis; membrana sordide hyalina, nervis flavis, basi macula externa albida notata; tibiis vix spinulosis, tarsis apicem versus obsolete infuscatis. ♂ ♀ long. 3 m. m.

Habitat in pratis sylvaticis rarissime. In insula Walamo, prope monasterium, d. 12 Jul. unicum specimen excipulo cepi. (In parœcia Pargas tria specimina legit O. Reuter.)

Parvus, colore ab omnibus nostris hujus generis speciebus facile distingvendus. — *Caput* nigrum, nitidum, bucculis anguste flavis. *Antennæ* corporis dimidio longiores, totæ flavæ, articulo primo capitis apicem excedente, secundo hoc vix triplo longiore, apicem versus obsolete incrassato, ultimis duobus tenuibus, simul sumtis præcedente longitudine subæquali. *Rostrum* abdominis segmentum secundum attingens, articulo primo crasso, nigro-fusco, secundo et tertio pallide flavis, ultimo apice infuscato. *Pronotum* transversum, longitudine plus duplo latius, supra convexum, nigrum, nitidum, versus margines laterales nigro-pubesçens. *Scutellum* triangulare, nigrum, modice convexum, prope basin linea transversim impressa. *Hemielytra* pallide griseo-testacea, subtiliter griseo-pubescentia, obsolete rugoso-punctata; corio apice macula laterali extrorsum dilatata, humerisque obsolete fulvis; clavo basi albido, extrorsum fulvo; membrana sordide hyalina, vitta angusta basali albida, nervis flavis. *Corpus* subtus totum fusco-nigrum. *Pedes* toti pallide testacei, coxis adhuc pallidioribus, tibiis vix spinulosis, tarsis apice infuscatis.

102. *Apocremnus ambiguus* Fall. cum varr. passim.

* 103. *A. (?) nigrutilus* Zett. *Ins. Lapp.* p. 275. 31. (*Phytocoris*).

In insula Walamo d. 10 Jul. unicum specimen excipulo cepi. (In parœcia Pargas a O. Reuter etiam inventus.)