

*Spanogonicus tiquiensis* n. sp.

(Fig. 47)

Caracterizada pela coloração e pela morfologia externa.

**Fêmea:** comprimento 1,7 mm, largura 0,9 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,32 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,1 mm; II, 0,3 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,2 mm. **Pronoto:** comprimento 0,3 mm, largura na base 0,6 mm. **Cúneo:** comprimento 0,20 mm, largura na base 0,35 mm.

Coloração geral preta; olhos castanho-avermelhados, rosto castanho, metade apical das tfbias e tarsos pálido-amarelados (varia nos exemplares: fêmeas com eles totalmente pretos outros pálido-amarelados).

Espécie braquiíptera, hemiólito não ultrapassando a base do VIII segmento abdominal, membrana bastante desenvolvida e aréola visível, embora rudimentar. Cabeça: larga, vertical, com antenas muito curtas (segmentos I e II mais curtos que a largura da cabeça), olhos contíguos ao pronoto. Corpo superiormente revestido por pilosidade curta, semiadpressa, com algumas cerdas longas, erectas no vértice e na margem anterior do pronoto, liso superiormente.

Lado inferior do corpo coberto por pilosidade idêntica. Rostro alcançando além das coxas posteriores. Fêmures engrossado, especialmente os posteriores. Tfbias com cerdas longas, erectas, exceto no terço basal.

**Macho:** desconhecido.

**Holótipo:** fêmea, Tiquisa, Bolívia, 3.800 m, XI.84, Pena col., na Coleção Carpintero.

**Parátipos:** 4 fêmeas, mesmas indicações que o tipo, nas coleções do primeiro e segundo autores.

Difere de *Spanogonicus aricanus* Carvalho, 1984, espécie da qual mais se aproxima, tanto pela morfologia como pela localização geográfica, pela coloração distinta, dimensões (especialmente da antena e rostro).

O nome específico é alusivo à localidade onde a espécie foi colecionada pelo colega chileno Luiz E. Pena.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERG, C., 1883, Addenda et emendanda ad Hemiptera Argentina (2). *An. Soc. Ci. Arg.*, 16:5-32, 73-87, 105-125, 180-191, 231-241, 285-294.
- BERG, C., 1892, Nova Hemiptera faunaram Argentinae et Uruguayensis. *An. Soc. Ci. Arg.*, 34:32, 33 e 34, 82-96, 193-205.
- BERG, C., 1892, idem, Typ. Pauli E. Coni et Filiorum, Bonariae, 112 p.
- CARVALHO, J.C.M., 1957, Catálogo dos Mirídeos do Mundo, Subfamílias Cylapinae, Deraeocorinae, Bryocorinae. *Arq. Mus. Nac. R. Jan.*, 44:1-197.
- CARVALHO, J.C.M., 1984, Mirídeos Neotropicais, CCLII: Descrições de novos gêneros e espécies da tribo Phylini Douglas & Scott (Hemiptera). *Bol. Mus. Para. E. Goeldi, Zool.* 1(2):143-206, 19 figs.
- CARVALHO, J.C.M. and DRAKE, J.C., Mirídeos Neotropical Miridae: Concerning the Pennington Collection (Hemiptera). *Rev. Ent. R. Jan.* 14(3):522-524.
- CARVALHO, J.C.M. and GOMES, I.P., 1971, Mirídeos Neotropicais, CVII: A tribo Clivinemini Reuter, no Brasil, com revisão do gênero Guanabarea Carvalho, 1984 (Hemiptera). *Arq. Mus. Nac. R. Jan.*, 54:89-93, 7 figs.
- SCHUH, R.T. and SCHWARTZ, M.D., 1985, Revision of the plant Bug Genus *Rhinacloa* Reuter with a Phylogenetic analysis (Hemiptera: Miridae). *Bul. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 179, Article 4, 258 figs.