

cabeza, a los lados de las antenas. Las mismas con pelos cortos y más ó menos densos. Hemiélitros lisos.

Lado inferior con pilosidad esparsa en abdomen y pelos cortos, semiadpressos en patas. Rostro alcanzando las coxas medianas.

Genitália: véscica (Fig. 35) con varias remificaciones como muestra la figura. Parámero izquierdo (Fig. 36) bifurcado en la extremidad apical, lobo basal grande y recubierto por cerdas largas. Parámero derecho (Fig. 37) también con el lobo basal grande y recubierto de cerdas.

Hembra: Semejante al macho en coloración y dimensiones.

Holotipo: macho, Sumalao, Salta, Arg., I-86, Carpintero, en la colección del segundo autor. *Paratipos:* 1 macho y 1 hembra, con las mismas indicaciones que para el holotipo, en las colecciones del primer y segundo autor.

Difere de *M. bicolor* Carv. & Carp., 1986, especie a la cual más se aproxima, por su diferente coloración y pilosidad, así como por su morfología y la estructura de la genitalia del macho.

El nombre específico, le fué dado por la localidad de la Provincia de Salta, Rep. Argentina, en la que estos ejemplares fueron hallados.

***Orthotylus singularis* n. sp.**

(Figs. 38 - 41)

Caracterizado por su coloración, estructura exterior, así como por la estructura de la genitalia del macho.

Macho: longitud 2,6 mm, ancho 1,0 mm.

Cabeza: longitud 0,3 mm, ancho 0,6 mm, vertex 0,30 mm. *Antena:* segmento I, longitud 0,2 mm, II, 0,7 mm, III, 0,5 mm, IV, 0,35 mm.

Pronoto: longitud 0,4 mm, ancho en la base 0,9 mm. *Cúneo:* longitud 0,5 mm, ancho en la base 0,35 mm.

Coloración general negra con áreas castaño rojizas. Cabeza, pronoto, extrema base del escutelo, mitad anterior del embolio, extrema base y ápice del segmento I de la antena y segmento II de la misma, excepto extrema base y ápice que son negros, castaño rojizos. Membrana oscura.

Lado inferior castaño claro, excepto abdomen y mitad apical de tarsos que son negros. Peritrema ostiolar blanco.

Cuerpo superiormente revestido por

pilosidad corta, esparsa, semiadpressa. Pelos de la cabeza y el pronoto con una pequeña puntuación en su base. Antenas con unas pocas cerdas largas, erectas, de igual longitud que el grosor del segmento, especialmente en el segmento I.

Lado inferior con igual pilosidad. Fémures con pelos cortos, esparsos. Tíbias con cerdas largas y semierectas. Rostro alcanzando las coxas medianas.

Genitália: Pênis (Fig. 39) teniendo la vesica con lobo esclerosado retorcido. Parámero izquierdo (Fig. 40) bifurcado, puntos afilados. Parámero derecho (Fig. 41) curvo, bifurcado en el extremo ápice.

Hembra: semejante al macho en coloración y dimensiones.

Holotipo: Hembra, Iguazú, Misiones, Arg., XII-79, Carpintero, en la colección del segundo autor. *Paratipos:* 2 machos y 2 hembras, con las mismas indicaciones que para el holotipo. 1 macho y 1 hembra Iguazú, Misiones, Arg., X-80, Carpintero, en las colecciones del primer y segundo autor.

Difere de las demás especies del género, por su típica coloración, por su morfología, así como por la estructura de la genitalia del macho.

El nombre específico está dado por su singular coloración, no habitual en las especies sudaricánas este género.

***Orthotylus vianai* n. sp.**

(Figs. 42 - 45)

Caracterizado por su coloración homogénea, su pequeño porte, así como por la estructura de la genitalia del macho.

Macho: longitud 2,6 mm, ancho 1,2 mm.

Cabeza: longitud 0,2 mm, ancho 0,7 mm, vertex 0,30 mm. *Antena:* segmento I, longitud 0,2 mm, II, 0,7 mm, III, 0,4 mm, IV, 0,2 mm.

Pronoto: longitud 0,4 mm, ancho en la base 1,0 mm. *Cúneo:* longitud 0,5 mm, ancho en la base 0,35 mm. (Holotipo).

Coloración general pálido amarillenta. Ojos plateados. Segmentos antenales III y IV, castaños, membrana oscura.

Lado inferior del mismo color. Ápice de los tarsos negro.

Cuerpo superiormente revestido por pilosidad corta, esparsa, adpressa, blanca, un poco más larga y erecta en cabeza. Antenas con pelos cortos, adpressos y densos.