

0,62 mm. Ancho: 0,64 mm. Vertex: 0,40 mm. *Antenas*: quebradas. *Pronoto*: long.: 0,53 mm. Ancho en la base: 0,62 mm.

La coloración general es negra con áreas pálido amarillentas. Cabeza castaño rojiza, excepto inferiormente que es negra. Embolio pálido amarillento. Lado inferior del mismo color, excepto episterno, epímero, ápice del rostro y tarsos que son negros. Demás características, como las citadas para el género.

4) *argentinus Agalliastes* Berg, 1883 (p. 77)

(= *Spanogonicus provincialis* Berg, 1883 n. sinon.)

"Tengo un sólo ejemplar encontrado en Chacabuco por el Sr. Lynch."

*Holot.*: hembra, Chacab. F. Lynch, A.a.B., *Agalliastes* n.sp. Reuter, Typus, 1613. MLP

En 1985 Carvalho describió el género *Papaveronia*, determinando como tipo del mismo la especie *P. argentina* (Berg, 1883). Esos ejemplares resultaron ser una especie distinta de la descrita por Berg, por lo tanto se le designa un nuevo nombre a aquella: *Papaveronia bergi* n.n. para *P. argentina* (Berg, 1883) Carvalho, 1985. Como descripción original de esta nueva especie se toma la dada por el autor en dicha publicación. El Holo y Paratipos, que erróneamente son allí designados, pues sólo debería serlo el ejemplar tipo determinado originariamente por Berg, se toman como típicos para esta nueva especie, a los que se agregan, como Paratipos; macho, Misiones, Arg., Dep. Concep., Sta. María, M. J. Viana, 47755, Almir del 19.6.61; macho, R. 9 km. 1650, Arg., Dto. La Caldera, Salta, 1300 m, Carpintero col.; macho, La Viña, Salta, II-84, Carpintero; hembra, Llama 2200 m., N. Peru, VI-56, en las colecciones del primero y segundo autor.

5) *argentinus Phytocoris* Berg, 1878 (p. 122)

(= *Horciasinus argentinus* (Berg, 1878) Carvalho & Jurberg, 1976)

"Esta especie que he observado en Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Cordoba y en la Rep. Oriental del Uruguay..."

*Lectot.*: macho, Bs.As., P.a.B., Typus, 1583. MLP.

*Paralectot.*: 2 larvas, Idem, MLP; hembra, Misiones, Typus, 100, P.a.B., MACN.

6) *bimaculatus Calocoris* (*Paracalocoris*) (Fabr., 1803) Berg, 1891 (p. 91)

(= *Taedia sulina* (Berg, 1891) Carvalho, 1954)

"Muchos ejemplares recogidos en el Territorio de las Misiones argentinas..."

*Lectot.*: hembra, Misiones, C. (P.) b. 03-68 (F.) Stål, 256. MLP. *Paralectot.*: hembra, Idem. MLP.

Ejemplar mutilado.

*var. vittata* Berg, 1891

*Lectot.*: macho, Misiones, var. v.B., 258. MLP. Tiene sólo un femur anterior y no hay antenas.

*Paralectot.*: macho, Idem, MLP. Sin patas ni antenas.

*var. niger* Berg, 1891

*Holot.*: hembra, Misiones, n. var., 880. MLP. No conserva ni patas ni antenas.

7) *bonaerensis Phytocoris* Berg, 1883 (p. 11)

"Los tres ejemplares que poseo de esta especie fueron recogidos por los Sres. Spegazzini y Lynch en Chascomús y Chacabuco."

*Lectot.*: macho, Chacab. F. Lynch, P.b.B., Typus, 1582. MLP

Se le restituye el status de especie, diferenciándose de *P. effictus* Stål, 1860, de la cual se consideraba sinónima, por su menor tamaño (con hemielitros más cortos), su coloración más oscura, tylus más prominente en vista dorsal y, especialmente por el mayor tamaño de sus ojos (en el macho), que consecuentemente dá una relación vertex-ancho de la cabeza de 1:2 en *p. bonaerensis* y de 1: 3,5-4 en *P. effictus*.

8) *cetratus Lygus* Berg, 1883 (p. 17)

(= *Proba vitiscuttis* (Stål, 1860). sinon. por Carvalho, 1959)

"Poseo 3 ejemplares que recogí en la Banda Oriental, a medianos de Febrero de 1883, en el Río Aguila en plantas acuáticas."

*Lectot.*: hembra, Banda Oriental, L.c.B., Typus, 1589. MLP. *Paralectot.*: macho y hembra, Idem. MLP

9) *chlorogaster Capsus* Berg, 1878 (p. 290)

(= *Cyrtopeltis* (*Tupicoris*) *chlorogaster* (Berg, 1878) China & Carvalho, 1952)

"Los 4 individuos de esta especie que poseo, fueron recogidos en Buenos Aires por D. En. Lynch."