

*Lectot.*: hembra, Bs.As., C.c.B., Typus, 1609. MLP. *Paralectot.*: hembra, Idem. MLP

10) *cinnamomea Resthenia* Berg, 1878 (p. 125)  
(= *Nanniresthenia cinnamomea* (Berg, 1878) Carvalho & Fontes, 1970)

"El individuo macho que poseo fué recogido cerca de Corpus."

*Holot.*: macho, Misiones, R.c.B., Typus, 1569. MLP. Se han perdido las patas y un hemielitro.

11) *correntina Resthenia* Berg, 1878 (p. 127)  
(= *Prepops flavoniger* (Stål, 1860) n. sinon.)

"Esta nueva *Resthenia* descubierta por el Prof. Katzenstein en Corrientes..."

*Holot.*: Corrientes, R.c.B., Typus, 1570. MLP. No tiene un hemielitro ni el abdomen.

Al observar el tipo de esta especie, el segundo autor notó, con sorpresa, que no correspondía a lo que hoy se consideraba la especie de Berg. Ese ejemplar es, inequívocamente, sinónimo de *P. flavoniger* (Stål, 1860), pues aquél presenta: cabeza, pronoto (excepto mancha triangular central), coxas y mitad basal de los fémures rojizos. Estas son características cromáticas muy típicas de la especie de Stål. Por lo tanto se denominará: *Prepops procorrentinus* n.n. para *Resthenia correntina* Carvalho & Fontes, 1970 nec Berg, siendo la descripción original la hecha en esa publicación.

*Holot.*: macho, San Roque, Corrientes, II-20,

Bosq, en la colección del Museo de La Plata.

*Parat.*: macho, Argentina, Delta, B. Aires, 33773, Almir del 28.9.62; 4 hembras Tucuman, Argentina, XII-49, Wygodz; 4 machos y 2 hembras Carmo do R. Claro, MG., 1.1958, Carvalho & Becker; macho, Idem Holotipo; 2 machos y 6 hembras Parque Rio Doce, Cel. Fabriciano, MG, III-78, Alvarenga col.; macho, Los Perales, Jujuy, R.A., III-48; hembra, Tartagal, Salta, V-1961; macho y hembra, La Paz, E, Rios, XII-72; macho y 3 hembras Porto Esperidiano, Caceres, M. Grosso, Brasil, XI-84, Magno & Alvarenga; hembra, Lagoa de Juturnaiba, Araruama, R.J., XI-1981, Malacologia col.; macho, M. Gerais, Brasil, V-64; hembra, San Pedro, Paraguay, XI-55; 3 machos y 2 hembras, Resistencia, Chaco, Arg., 1936; 6 machos y 3 hembras, P. N. Iguazú, Misiones, XII-

79 y X-80; 2 hembras, Glew, Pcia.Bs.As., I-1973 y II-1974; hembra, San Pedro, Jujuy, IV-79, en las colecciones del primero y segundo autor.

12) *costicollis Miris* Berg, 1878 (p. 118)  
(= *Megaloceroea costicollis* (Berg, 1878) Atkinson, 1890)

"esta especie descubierta en el Baradero por el Sr. Lynch, y de la que tengo 2 ejemplares mutilados..."

*Lectot.*: hembra, Baradero F. Lynch, Typus, 1566, MLP. Sin cabeza ni pronoto.

13) *crucifera Resthenia* Berg, 1878 (p. 124)  
(= *Prepops cruciferus* (Berg, 1878) Carvalho, 1959)

"Tengo un sólo macho que fué encontrado en Buenos Aires."

*Holot.*: macho, Buenos Aires, R.c.B., Typus, 1571. MLP. Sólo permanecen la cabeza con una antena, el pronoto y escutelo.

14) *dissociata Resthenia* Berg, 1891 (p. 87)  
(= *Platytylus dissociatus* (Berg, 1891) n. comb.)

"Dos ejemplares de que uno procede de la provincia de Salta y el otro de la Nueva Helvecia, de la Rep. Oriental del Uruguay."

*Lectot.*: macho, Salta, 454, Typus, 1572. MLP. No tiene abdomen ni patas.

*Typus*: macho, Uruguay, Nueva Helvecia, XII-1891, R.d.B., Typus, 1572. MLP. Este segundo ejemplar, aunque siendo cromáticamente similar al anterior, posee el pronoto visiblemente carenado lateralmente en toda su extensión y es de menor tamaño.

15) *egregius Atractotomus* Berg, 1883 (p. 79)  
(= *Bergmiris egregius* (Berg, 1883) Carvalho, 1984)

"Varios ejemplares que poseo de este Hemíptero originario de Chacabuco los debo al celo y a la amabilidad del Sr. Felix Lynch."

*Lectot.*: hembra, Chacabuco, F. Lynch, A.e.B., Typus, 1612. MLP. *Paralectot.*: 1 macho, 1 hembra y 2 ninfas, Idem. MLP

16) *eryngii Poeciloscytus* Berg, 1883 (p. 19)  
(= *Polymerus modestus* (Blanchard, 1852) n. sinon.)

"Fueron recogidos 2 ejemplares entre las hojas del