

*Eryngium agavifolium* Grb., llamado vulgarmente "escorzonera" por el Sr. D. Guillermo Günther."

*Lectot.*: hembra, Buenos Aires, Günther, P.e.B., 1593. MLP. *Paralectot.*: ninfa, Idem. MLP

17) *erythronotus Eccritotarsus* Berg, 1883 (p. 24) (= *Pachymerocerus erythronotus* (Berg, 1883) Reuter, 1909)

"Fué coleccionada en Mercedes, en las orillas del Rio Negro, por el Sr. D. Enrique Lynch Arribálzaga, quién me obsequió con algunos ejemplares." *Lectot.*: Hembra, Banda Oriental, E.e.B., Typus, 1603. MLP. *Paralectot.*: 1 macho y 1 hembra, Idem. MLP

18) *flavicosta Resthenia* Berg, 1883 (p. 106) (= *Prepops flavicosta* (Berg, 1883) Carvalho, 1959)

"Ha sido recogida en Buenos Aires en varios ejemplares por el Rev. P. Meister y sus discípulos."

*Lectot.*: hembra, Buenos Aires, R.f.B., 455, Typus, 1573. MLP. *Paralectot.*: hembra, Idem. MLP

19) *fratruelis Capsus (Deraeocoris)* Berg, 1878 (p. 289)

(= *Hyporhinocoris fratruelis* (Berg, 1878) n. comb.)

"Fué traído en 2 ejemplares del Rio Colorado, al sur de la provincia de Buenos Aires por el Dr. A. Doering."

*Neotipo*: hembra, Sta. Fe, Dto. Garay, Col. Macías, M. J. Viana, XI-42. MACN. La descripción original nos ayuda a certificar la validez del neotipo.

20) *fuegiana Resthenia* Berg, 1895 (p. 200) (= *Nanniresthenia fuegiana* (Berg, 1895) Carvalho, 1961)

"De esta especie fueron recogidos 6 ejemplares, en su mayor parte hembras, en el mes de enero y a principios de febrero en Filaret."

*Lectot.*: hembra, Tierra del Fuego, Typus, 1574. MLP. *Paralectot.*: 1 macho y 4 hembras, Idem. MLP

21) *hirtula Resthenia (Resthenia)* Berg, 1891 (p. 85)

(= *Mabelia hirtula* (Berg, 1891) Carvalho & Fontes, 1971)

"El único ejemplar que poseo de esta nueva especie fué recogido en la parte septentrional de Misiones por el Sr. Backhausen."

*Holot.*: hembra, Misiones, R.h.B., Typus, 1575. MLP. Tiene un hemielitro quebrado.

22) *holmbergi Eccritotarsus* Berg, 1883 (p. 26) (= *Parafurius discifer* (Stål, 1860). sinon. por Carvalho, 1944)

"El único ejemplar que tengo a la vista ha sido encontrado en el mes de febrero de 1881, en la Isla Antequera."

*Holot.*: hembra, Isla Antequera, Dr. Holmberg, Feb. 1881, E.h.B., Typus, 1599. MLP. No tiene un hemielitro.

23) *humeralis Calocoris* Berg, 1891 (p. 89) (= *Horciasinus humeralis* (Berg, 1891) Carvalho & Jurberg, 1976)

"Esta nueva especie... fué descubierta en el Departamento de Monte Agudo, por el Sr. Juan B. Ambrosetti. Los ejemplares típicos se encuentran en el Museo Nac. de Buenos Aires y en la colección mía."

*Lectot.*: hembra, Misiones, Typus, 1584. MLP. *Paralectot.*: macho y hembra, Idem. MLP

24) *lineolatus Calocoris* Berg, 1891 (p. 90) (= *Taedia lineolata* (Berg, 1891) Carvalho & Gomes, 1971)

"De esta nueva especie poseo un sólo ejemplar sin patas que fué recogido en la misma ciudad de Cordoba."

*Holot.*: hembra, Cordoba, C.I.B., Typus, 1585. MLP

25) *lucidus Antias* Berg, 1891 (p. 95) (= *Posantias lucidus* (Berg, 1891) Carvalho, 1989)

"De esta nueva especie caracterizada por las líneas de diferente color del exocorio y el cúneo, poseo un sólo ejemplar algo mutilado, y procedente de la parte septentrional de Misiones."

*Holot.*: hembra, Misiones, A.I.B., Typus, 1596. MLP. Sin un hemielitro ni el clavo del otro.

26) *luculentus Eccritotarsus* Berg, 1891 (p. 195) (= *Aspidobothrus luculentus* (Berg, 1891) Carvalho & China, 1951)

"Un sólo ejemplar recogido en la parte sep-