



*Sericophanes tigrensis* n. sp.; Fig. 17 – pênis; Figs. 18, 19 – parâmetro direito.

***Sericophanes tigrensis* n. sp.**

*Sericophanes parviceps* Carvalho, 1944: 521,  
figs. 9-12 nec Poppius, 1914.  
(Figs. 17 - 19)

A nova espécie difere da descrição original de Poppius por ter a mancha ocelóide do clavo ocupando grande parte de sua extensão, alcançando, inclusive, o ápice do escutelo (Fig. 9, 1944). O fato da nova espécie ter sido atribuída a *S. parviceps* decorre do fato do pequeno conhecimento que o autor senior tinha na ocasião do trabalho e pelo uso da chave para identificação das espécies transcrita em Poppius (1921), baseada na coloração do corpo. A fim de caracterizar melhor a espécie são novamente repetidas neste trabalho, sob duas posições diferentes, a figura do parâmetro direito, incluído também a figura do pênis.

**Fêmea:** embora braquíptera, hemiélitro recobrimdo praticamente o abdome, com o tubo anal visível exteriormente.

**Holótipo:** macho, ARGENTINA, Tigre, 4.43, c. Carvalho (Visna leg), na coleção do Museu Argentino de Ciências Naturais "Bernardino Rivadavia", Buenos Aires. **Parátipos:** macho e fêmea, mesmas indicações que o tipo; macho, PARAGUAY, Horqueta, A. Schulze, 1938, na coleção do autor.

Diferencia-se das demais espécies do gênero na América do Sul por ter a pubescência muito curta; a mancha ocelóide do clavo grande e alcançando o ápice do escutelo; parâmetro direito com morfologia caracterfstica.

O nome específico é alusivo ao local de coleta do holótipo.

***Sericophanes bolivariensis* n. sp.**

(Figs. 20 - 23)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

**Macho:** comprimento 3,2 mm, larugra 0,7 mm (parte mais estreita do hemiélitro). **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vértice 0,28 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III, 0,5 mm; IV mutilado. **Pronoto:** comprimento 0,5 mm, largura na base 0,8 mm **Cúneo:** comprimento 0,40 mm, largura na base 0,30 mm (holótipo).

Coloração geral castanha com áreas pálido-amareladas e brancacentas; cabeça, pronoto e escutelo castanho-escuros, collar e hemiélitros castanhos, clavo com mancha ocelóide grande, atingindo a sutura clavo-corial e comissura claval, três faixas pruinosas prateadas: sub-basal, mediana e subapical, a mediana sucedida posteriormente por faixa transversal mais escura, cúneo negro, membrana fusca, uniforme.

Lado inferior castanho, porção apical do abdome mais escura, peritrema ostiolar e ápices das coxas II e III mais claros, extremo ápices dos fêmures e das tfbias mais claros.

Rostro alcançando as coxas III, tfbias III com cerdas muito longas, notadamente mais lonas que sua grossura.

**Genitália:** pênis do tipo genérico. Parâ-