



*Sericophanes panamensis* Carvalho: Fig. 24 - macho, parátipo.

*Sericophanes oscurus* Maldonado, 1970: 101, figs. 7 - 9, n. sfn.  
(Figs. 24 - 42)

Descrita de exemplares do Panamá (Zona do Canal) e Cabo Frio, Colômbia e tidos como semelhantes a espécie de Knight, 1918, foi posteriormente (1955) reconhecida como boa espécie e diferente da de Knight. O holótipo (Canal Zone, Panamá, 20.X.1939, C.J. Drake) foi entregue a coleção do Museu Nacional de

História Natural dos Estados Unidos da América, Washington, E.C. (Carvalho e Froeschner, 1987: 210).

Neste trabalho acham-se ilustrados novamente o pigóforo e os parâmeros da espécie (macho oriundo do Panamá, Zona do Canal, Summit). Foram também desenhados novamente (desta vez dissecados) as peças da genitália de *fuscus*, *nugripes* e *oscurus* Maldonado (Figs. 28 - 33, 36 - 40, 42), cujas variações são consideradas de natureza individual e não específica. Exemplar de Cartagena, Colômbia acha-se também figurado. As diferenças relativas a forma de mancha no clavo e sua extensão (geralmente mais fraca, porém visível no cório) e na forma das peças genitais, são sem dúvida ofuscadas pelo pequeno porte, coloração quase sempre negra dos exemplares e área geográfica dos exemplares. Esta é a razão da sinonímia apresetada acima.

**Distribuição geográfica:** PANAMÁ, Zona do Canal; VENEZUELA, Estados de Lara (Tocuyo) e Cojedes (Tinaco); COSTA RICA, El Palmar; COLÔMBIA, Cabo Frio, Cartagena, Venezuela, 20 km E. Carola, 24.VI.76, A.S. Menke e D. Vincenti; Panamá, Summit e Ft. Clayton, XII.46, N.L.H. Krauss,

**Holótipos** na coleção do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos da América. As três espécies de Maldonado tiveram suas genitálias dissecadas e ilustradas pelos autores.

***Sericophanes ocellatus* Reuter, 1876**  
*Sericophanes ocellatus* Reuter, 1876: 79; id. Knight, Bul. Brook. Ent. Soc., 1918: 80, Carvalho, 1944: 518, figs. 1 - 4.  
(Figs. 43 - 45)

Embora a inclusão desta espécie fuja ao escopo do trabalho, os autores decidiram incluir ilustrações do pigóforo e dos parâmeros, pelo motivo das mesmas terem sido feitas precariamente em Carvalho (1944). Os 3 exemplares da Argentina ali mencionados são *ornatus* (Berg).

Exemplar estudado: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: College Station, Texas.

***Sericophanes heidemanni* Poppius, 1914**  
*Sericophanes heidemanni* Poppius, 1914: 260.  
*Sericophanes noctuans* Knight, 1917: 4;