

coberto, escutelo proeminente, profundamente pontuado.

Hemiélitros arredondados lateralmente, com fratura cuneal longa e horizontal, embólio explanado, membrana biareolada, transparente.

Lado inferior com peritrema ostiolar bem marcado, coxas, fêmures e tíbias normais, revestidos por pilosidade curta.

Espécie tipo: *Paracoris nordicus* n.sp.

Muito semelhante a *Deraeocoris* Kirschbaum, 1855, porém com a fronte sulcada longitudinalmente, jugo visto de cima, cabeça horizontal, pontuda para frente.

O nome genérico é alusivo ao Estado do Pará, Brasil, onde se acha a cidade de Itaituba.

*Paracoris nordicus* n.sp.

(Fig. 4)

Caracterizada pela coloração do corpo.

*Fêmea*: comprimento 4,0 mm, largura 2,0 mm. *Cabeça*: comprimento 0,5 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,36 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,22 mm; II, 0,9 mm; III e IV mutiladas. *Pronoto*: comprimento 0,9 mm, largura na base 0,6 mm. *Cúneo*: comprimento 0,60 mm, largura na base 0,40 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo castanho-escuro com faixas oblíquas brancacentas; cabeça, calos e escutelo mais claros, jugo, loro e clípeo castanho-escuros, restante da cabeça pálido inferiormente.

Hemiélitros castanho-escuros com faixa oblíqua ao longo da nervura do clavo, meio da nervura radial no cório, mancha basal interna no cúneo e nervuras das membranas brancas a brancacentas.

Lado inferior do corpo castanho-escuro; porção inferior da propleura, região apical das coxas, trocanteres e base dos fêmures pálidos, abdome com faixa mediana interrompida mais clara dos lados.

*Machos*: desconhecido.

*Holótipo*: fêmea, Brésil du Nord (Estado do Pará). Itaituba, Ost. BH., na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

A coloração dos hemiélitros torna a espécie característica.

O nome específico é alusivo à região Norte do Brasil.

*Phytocoris aconcaguensis* n.sp.

(Figs. 5, 20-22)

Caracterizada pela morfologia da genitália do macho.

*Macho*: comprimento 6,0 mm, largura 1,7 mm. *Cabeça*: comprimento 0,4 mm, largura 1,2 mm, vértice 0,36 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,8 mm; II, 2,0 mm; III, 1,2 mm; IV, 0,6 mm. *Pronoto*: comprimento 0,7 mm, largura na base 1,6 mm. *Cúneo*: comprimento 1,00 mm, largura na base 0,48 mm (parátipo).

Coloração geral do corpo marmoreada de castanho e pálido-amarelado; cabeça tendo vértice com uma mancha clara no meio, pálida, com manchas castanhas, fronte com estrias oblíquas também castanhas, clípeo com duas manchas na base e extremo ápice castanhos, loro e gula com faixas longitudinais castanhas, gula no meio e búcua castanhos, região do pescoço atrás dos olhos com duas faixas longitudinais, a superior mais curta; antena com segmento I pálido, manchado de castanho, cerdas erectas negras, segmento II pálido na extrema base e negro no ápice, com pêlos curtos e cerdas erectas aproximadamente da largura do segmento, III e IV fuscas; rostró pálido.

Pronoto com colar marmoreado de castanho, pálido no meio, calos medianos com duas manchas pretas atrás, margem sub-basal do disco com manchas marmoreadas irregulares (manchas pretas irregulares), ângulos umerais pretos; mesoescuto praticamente coberto, escutelo marmoreado de castanho e claro, com faixa longitudinal pálida e duas manchas pretas preapicais.

Hemiélitros marmoreados de castanho e pálido-amarelado, endocório e região comissural do cório com pontos pretos interrompidos, ápice do embólio e cúneo com ápices pretos, paracúneo com manchas pretas na margem interna, membrana marmoreada.

Lado inferior do corpo com propleura tendo duas faixas pretas longitudinais, abdome com faixa pálida longitudinal tendo dos lados faixas in-