

Parâmero esquerdo (Fig. 30) com lobo sub-basal, curvo do lado externo, terminado em ponta. Parâmero direito (Fig. 31) menor, simples, afilado para o ápice.

*Fêmea*: desconhecida.

*Holótipo*: macho, Panamá, Santa Fé, Veraguas, 2900 ft., 15 Feb. 74, col. D. Engleman, no Museu de História Natural dos Estados Unidos da América do Norte, Washington, D.C.

Difere das outras espécies pela morfologia da genitália do macho.

O nome específico é alusivo a Veraguas, Panamá.

*Prepops bastensis* n.sp.

(Figs. 9, 32-34)

Caracterizada pela coloração negra do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

*Macho*: comprimento 6,0 mm, largura 1,8 mm. *Cabeça*: comprimento 0,4 mm, largura 1,1 mm, vértice 0,46 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,8 mm; II, 1,8 mm; III e IV mutilados. *Pronoto*: comprimento 1,2 mm, largura na base 1,6 mm. *Cúneo*: comprimento 0,80 mm, largura na base 0,50 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo preta.

Lado inferior preto, parte posterior do loro, gena e gula, porção inferior do colar, mancha posterior inferiormente na propleura, placa basilar, coxas, fêmures inferiormente, região inferior do abdome pálidos.

Rostro alcançando o meio do mesoesterno (partido no meio), demais caracteres como em *Prepops* Reuter, 1905.

*Genitália*: vésica (Fig. 32) como mostra a figura, com dois espículos medianos, lobos membranosos e um lobo lateral com espinhos na parte superior. Parâmero esquerdo (Fig. 33) bastante curvo, serreado internamente e com pêlos dorsais. Parâmero direito (Fig. 34) alongado, também curvo na extremidade apical e com pêlos dorsais.

*Fêmea*: desconhecida.

*Holótipo*: macho, Vila Bastos, Sto. (Santo) André, S. (São) Paulo, Brasil, 13.II.1962, L. Stow-

bunencko col., na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

A morfologia da genitália do macho separa a espécie das outras do gênero.

O nome específico é alusivo à Vila Bastos, Município de Santo André, Estado de São Paulo.

*Prepops cajuruensis* n.sp.

(Figs. 10, 35-37)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

*Macho*: comprimento 8,4 mm, largura 2,6 mm. *Cabeça*: comprimento 0,5 mm, largura 1,5 mm, vértice 0,70 mm. *Antena*: mutilada. *Pronoto*: comprimento 1,4 mm, largura na base 2,4 mm. *Cúneo*: comprimento 1,30 mm, largura na base 0,70 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo preta com áreas lutescentes; cabeça (exceto das manchas oblíquas no vértice, olhos, clipeo e ápice do loro que são pretos) lutescente.

Pronoto lutescente com ângulos umerais pretos; mesoesclerito e esclerito pretos.

Hemiélitros pretos.

Lado inferior do corpo lutescente, exceto coxas I, ápice das coxas II e III, lados do mesoesterno, pigóforo e pernas que são pretos.

Rostro alcançando as coxas II.

*Genitália*: vésica (Fig. 35) com três espículos bem marcados, lobos com dentículos e um lobo serreado, como mostra a figura. Parâmero esquerdo (Fig. 36) curvo, lobo basal mal marcado, extremidade apical afilada, pêlos dorsais. Parâmero direito (Fig. 37) menor, com vários pêlos dorsais. Extremidade apical com depressão subapical, como mostra a ilustração.

*Fêmea*: desconhecida.

*Holótipo*: macho, Cássia dos Coqueiros, Mun. (Município) de Cajuru, SP (São Paulo), Br (Brasil), XI.XII.1954 – I.1955, M. P. Barreto col., na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Diferencia-se de outras espécies do gênero pela morfologia da genitália do macho e pela coloração da cabeça e do pronoto.

O nome específico é alusivo à cidade de Cajuru, em cujo Município foi colecionado o tipo.