



Genitalia do macho: *Prepopa bastensis*, Fig. 32 — vésica; Fig. 33 — parâmero esquerdo; Fig. 34 — parâmero direito; *Prepopa cajuruensis*, Fig. 35 — vésica; Fig. 36 — parâmero esquerdo; Fig. 37 — parâmero direito; *Prepopa guaduensis*, Fig. 38 — vésica; Fig. 39 — parâmero esquerdo; Fig. 40 — parâmero direito.

Prepopa guaduensis n.sp.

(Figs. 11, 38-40)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 8,4 mm, largura 3,2 mm. **Cabeça:** comprimento 0,5 mm, largura 2,8 mm, vértice 0,76 mm. **Antena:** segmento I, com-

primento 1,2 mm; II, 3,2 mm; III e IV mutilados.

Pronoto: comprimento 1,6 mm, largura na base 2,4 mm. **Cúneo:** comprimento 1,40 mm, largura na base 0,70 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo preta com áreas lútescentes; cabeça lútescente, negra apenas dos lados da fronte e no clípeo (duas manchas depresas na base do vértice pretas), faixa longitudinal