

percorrendo o meio do vértice e fronte lutescente, olhos, antenas e rostro pretos.

Pronoto, mesoescuto e escutelo lutescentes, calos pretos.

Hemiélitros pretos, membrana negra.

Lado inferior do corpo com propleura, mancha dos lados do mesoesterno e mesopleura lutescentes, coxas, pernas e abdome pretos.

Rostro alcançando as coxas III, pilosidade relativamente curta, tíbias III com pêlos mais curtos que a grossura da tíbia.

Genitália: vésica (Fig. 38) com três espículos bem marcados e lobos membranosos com espinhos em seu ápice, tubo seminal distal curvo no meio. Parâmero esquerdo (Fig. 39) curvo, com extremidade apical em forma de ponta aguda e pêlos dorsais longos. Parâmero direito (Fig. 40) mais engrossado na extremidade subapical, terminado em ponta e com pêlos dorsais curtos.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, Baixo Guandu, S. Sto. (Espírito Santo), BRASIL, 9-14.XI.70, C. Elias leg., na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Difere das demais espécies de *Prepops* Reuter pela morfologia da genitália do macho, sobretudo da vésica.

O nome específico é alusivo à Guandu (Baixo), Estado do Espírito Santo, Brasil.

***Prepops imperatrizensis* n.sp.**

(Figs. 12, 41-44)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 5,6 mm, largura 1,8 mm. **Cabeça:** comprimento 0,3 mm, largura 1,1 mm, vértice 0,50 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,7 mm; II, 1,6 mm; III, 1,1 mm; IV, 0,7 mm. **Pronoto:** comprimento 1,0 mm, largura na base 1,6 mm. **Cúneo:** comprimento 0,70 mm, largura na base 0,40 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo preta com áreas lutescentes; cabeça dos lados da antena e com faixa mediana longitudinal, percorrendo também o colar, disco do pronoto, escutelo (exceto lados que são negros) e cúneo lutescentes.

Lado inferior com jugo (exceto ápice), loro, búcula, gena e gula, colar inferiormente, xifo do prosterno, porção inferior da propleura, mesoescuto (exceto lados que são negros), pleuras, abdome (exceto manchas laterais interrompidas nos segmentos), pigóforo na extremidade, coxas e base dos fêmures lutescentes.

Rostro alcançando as coxas II, pêlos dos segmentos antenais curtos adpressos e pêlos erectos, pêlos das tíbias III tão ou mais longos que o diâmetro das mesmas.

Genitália: vésica (Fig. 41) como mostra a figura, com dois espículos bem marcados, um deles com dois dentes e uma formação espicular serreada (Fig. 42). Parâmero esquerdo (Fig. 43) mais grosso sub-basalmente, com pêlos dorsais e ponta recurva. Parâmero direito (Fig. 44) pequeno, terminado em ponta e com pêlos subapicais.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, Imperatriz, MA (Estado do Maranhão), (Brasil), 18.VII.79, na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Diferencia-se das outras espécies do gênero pela morfologia da genitália do macho. É próxima de *Prepops lopesi* Carvalho & Fontes, 1973 diferenciando-se pela coloração do pronoto e também a do lado inferior do corpo.

O nome específico é alusivo à cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, Brasil.

***Prepops mariliensis* n.sp.**

(Figs. 13, 45-46)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 6,4 mm, largura 1,9 mm. **Cabeça:** comprimento 0,4 mm, largura 1,2 mm, vértice 0,54 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,8 mm; II, 1,9 mm; III, 0,8 mm (?); IV mutilado. **Pronoto:** comprimento 1,2 mm, largura na base 1,8 mm. **Cúneo:** comprimento 0,90 mm, largura na base 0,50 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo cinamómea com áreas mais claras; cabeça com mancha no vértice, lado dos olhos e lados da cabeça cinamómeos, clipeo e antena pretos, rostro fusco.