

posterior arredondada, sem carena; vista de lado em ângulo reto, afilada para o ápice, clipeo pequeno, saliente, epifaringe pequena, rostro atingindo as coxas posteriores (?), antena perdida após a mensuração, ao retirar a genitália.

Pronoto com colar deprimido, calos grandes, salientes, margem posterior do disco reintrante, ângulos umerais arredondados, margens laterais caídas; mesoescuto largamente descoberto, grande; escutelo levemente rugoso transversalmente.

Hemiélitros com embólio explanado, clavo alongado, cúneo mais longo que largo na base, membrana com uma só célula.

Lado inferior do corpo com propleura lisa, coxas I anteriores, fêmures com cerdas longas inferiormente, tíbias com pêlos curtos e longos, estes cerca de 3 vezes a largura de uma tíbia (posteriores), tarsos longos.

Espécie tipo: *Tibiopilus pedunculatus* n.sp.

O gênero é caracterizado por ter os olhos pedunculados e pêlos das tíbias muito longos.

O nome científico é alusivo aos longos pêlos das tíbias.

#### *Tibiopilus pedunculatus* sp.n.

(Figs. 6-10)

*Tipo*: macho, holótipo, Brasil, Rondônia, 62km SW Ariquemes, nr. Fazenda Rancho Grande, 6-15.XII.1990, D.A. Rider & J.E. Eger, na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

*Diagnose*: caracterizada pelos longos pêlos das tíbias, pelos olhos pedunculados e pela morfologia da genitália do macho.

*Descrição*: (Medidas em mm). Corpo, comprimento 4,2; largura 1,3. *Cabeça*: comprimento 0,2; largura 0,8; vértice 0,34. *Antena*: segmento I,

comprimento 0,6; II, 1,6; III, 1,0; IV, 0,4. *Pronoto*: comprimento 0,5, largura na base 1,1. *Cúneo*: comprimento 0,60, largura na base 0,44 (holótipo).

Preto com hemiélitros parcialmente pálidos; segmento I da antena, extrema base do II, que juntamente com III e IV pálido-amarelados, olhos pálidos; cabeça, pronoto, escutelo, comissura claval (largamente), mancha grande na comissura corial, afilada para fora e alcançando o embólio, ápice do cúneo e membrana negros; cabeça vermelha com mancha preta no vértice, na frente e metade apical do clipeo.

Lado inferior preto (exceto trocanteres), pernas (fêmures com pêlos longos inferiormente, tíbias com pêlos longos, cerca de 5 vezes a grossura da tíbia, as anteriores e medianas com ápice pálido).

*Genitália*: pênis (Fig. 7) dobrado sobre si mesmo, placa basal relativamente pequena, abertura genital próxima do ápice, téca (Fig. 8). Parâmero esquerdo (Fig. 9) com lobo direito em ponta recurva, lobo direito alongado. Parâmero direito (Fig. 10) muito pequeno, dilatado no meio e fino para o ápice.

*Fêmea*: desconhecida.

Espécie característica pelos longos pêlos das tíbias, pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

O nome específico é alusivo aos longos pêlos das tíbias.

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MIRÍDEOS NEOTROPICAIS, CCCLXXIV: Gêneros e espécies novos de Rondônia (Hemiptera), (no prelo).