

23




Fig. 23 – *Neosilia dollingi* n. sp., fêmea, holótipo.

dinalmente até recobrir os calos (sem alcançar os calos em alguns exemplares) e escutelo pretos.

Hemiélitros lúteos, faixa longitudinal ao longo da comissura claval, faixa transversal larga ao nível do ápice do clavo, embólio, margem interna e externa do cúneo e nervura da membrana pretos.

Lado inferior com a região da propleura lútea, mancha posterior da fenda coxal I completa até sua extremidade inferior, mancha anterior a mesma fenda presente apenas na região mediana, deixando a margem inferior (anterior) lutescente, meso-esterno, meso e metapleuras, coxas, fêmures pretos com região basal pálida, tíbias e tarsos pretos.

Pilosidade do corpo muito curta e adpressa, olhos muito pedunculados, voltados para cima, calos salientes, separados entre si por uma fossa,

pronoto pontuado, embólio grosso, cúneo duas vezes mais longo que largo na base, nervura da membrana reta, rostrando alcançando as coxas posteriores.

**Genitalia:** parâmetro esquerdo (Fig. 25) característico, com o lobo basal muito desenvolvido, recoberto de cerdas, lobo principal fino e recurvo na extremidade apical. Parâmetro direito (Fig. 26) grande, longo e curvo, com numerosas cerdas dorsais. Pigóforo (Fig. 27) também característico, conforme mostra a ilustração.

**Fêmea:** desconhecida.

**Holótipo:** macho, BRASIL, Pará, Serra Norte, Estrada do Fofoca, 17.VIII.1984, na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro. **Parátipos:** 2 machos, mesmas indicações que o tipo; 4 machos, BOLÍVIA, Buena Vista, Prosen col.; 3 machos, Bolívia, Província Sara, Steinbach S., nas coleções do Museu Paraense Emílio Goeldi e do autor.

Difere de *Neoleucon horribilis* Distant, 1884 pela coloração do corpo e pela morfologia da genitalia do macho.

O nome específico é alusivo a sua localização geográfica ao sul do Equador.

#### *Pachymerocerista manauara* n.sp.

(Fig. 28)

Caracterizada pela sua coloração e pelo tamanho do corpo.

**Fêmea:** comprimento 2,2 mm, largura 0,9 mm. **Cabeça:** comprimento 0,1 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,32 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 0,4 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,3 mm. **Pronoto:** comprimento 0,5 mm, largura na base 0,8 mm. **Cúneo:** comprimento 0,32 mm, largura na base 0,24 mm (holótipo).

Coloração geral castanha com áreas castanho-escuras e lutescentes; cabeça, olhos e antena castanhos, segmento I castanho-claro, segmento II castanho-escuro, segmentos III e IV avermelhados; lados da cabeça e rostrando pálido-avermelhados.

Pronoto com disco e escutelo castanho-escuros, área anterior aos calos lutescente-avermelhada.

Hemiélitro castanho-escuro, parte basal do cório e do embólio, parte mediana do clavo e cúneo (exceto extremidade apical) pálidos a castanho-claros; membrana fusca.

Lado inferior castanho-escuro, coxas pálidas, fêmures castanho-escuros, tíbias castanho-claras.