



Eurotas reinhardt n. sp.: Fig. 7 – macho, holótipo; Fig. 8 – ápice da tíca; Fig. 9 – parâmero esquerdo; Fig. 10 – parâmero direito.

Marinonicoris n. gen.

Orthotylinae, Ceratocapsini. Aspecto geral mirmeecófilo, corpo liso, revestido de pêlos muito curtos e faixas transversais de escamas prateadas e alongadas, mais estreito na base, cório proeminente em sua porção external apical.

Cabeça inclinada, olhos grandes, ocupando a metade posterior da cabeça, contíguos ao pronoto, alcançando a gula inferiormente, fronte caída para a frente, vértice marginado posteriormente; antena cilíndrica, segmentos engrossados para a extremidade apical, segmentos III e IV fusiformes, pubescência muito curta; rostró alcançando as coxas II.

Pronoto com colar deprimido, porção anterior do disco estreitado ao nível dos calos que são obsoletos, ângulos umerais salientes, disco proeminente, margem posterior arredondada; mesoescuto caído para trás, escutelo pequeno, plano.

Hemiélitros nitidamente mais estreitos na base, cório saliente na porção apical externa, cúneo mais longo que largo na base, fratura distinta, membrana biareolada.

Pernas anormais, abdome estreitado na porção basal.

Espécie tipo do gênero: *Marinonicoris myrmecoides* n. sp.

Difere de *Renodaeus* Distant, 1893 pela ausência de pêlos longos, erectos no corpo.