



Eurotas brasilianus Carvalho e Wallerstein, 1976 Fig. 11 – ápice do pigóforo; Fig. 12 – pênis; Fig. 13 – detalhe da vésica; Fig. 14 – parâmero esquerdo; Fig. 15 – parâmero direito.

O nome genérico é dado em homenagem ao meu colega Renato Cotrim Marinoni, Professor de Entomologia da Universidade Federal do Paraná, conhecido especialista em coleópteros da família dos Cerambycídeos.

***Marinonicoris myrmecoides* n. sp.**
(Figs. 16 - 19)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 3,4 mm, largura na

parte mais estreita do hemiélitro 1,0 mm. **Cabeça:** comprimento 0,1 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,30 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 0,6 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,3 mm. **Pronoto:** comprimento 0,6 mm, largura na base 1,1 mm. **Cúneo:** comprimento 0,50 mm, largura na base 0,32 mm (holótipo).

Coloração geral castanho-escuro com áreas castanhas e brancacentas; segmento I da antena (às vezes também o II), área dos calos no pronoto castanho-claros; cabeça, pronoto e