

raná, BRASIL, Reserva Samuel Klabin, 2.XI.1986, Lev. Ent. ProfauPar, lâmpada, na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro. *Parátipos*: 2 machos, mesmas indicações que o tipo; macho, Fênix, Paraná, Res. Est. ITCF, 1.XI.1986, Lev. Ent. ProfauPar., lâmpada; macho, Jundiá do Sul, Paraná, Fazenda Monte Verde, 4.XI.1986, Lev. Ent. ProfauPar., lâmpada, nas coleções do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná e do autor.

O nome específico é alusivo à sua semelhança com formigas.

***Fulvius minimus* n. sp.**  
(Figs. 20 - 27)


Caracterizada pelo seu pequeno porte e pela morfologia da genitália do macho.

*Fêmea*: comprimento 2,4mm, largura 0,7 mm. *Cabeça*: comprimento 0,3 mm, largura

0,4 mm, vértice 0,26 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 0,6 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,6 mm. *Pronoto*: comprimento 0,4 mm, largura na base 0,7 mm. *Cúneo*: comprimento 0,32 mm, largura na base 0,14 mm (holótipo).

Coloração geral castanho a castanho-escura com áreas brancas e translúcidas; segmento I da antena mais pálido, segmento II negro, pálido na porção apical, segmentos III e IV negros, porção posterior do disco do pronoto, escutelo (exceto mancha branca apical), base do clavo. Áreas adjacentes às manchas brancas e ápice do cúneo mais escuros a negros; duas manchas oblíquas translúcidas no meio do cório e duas manchas brancas na base do cúneo, membrana negros. A porção anterior do pronoto e o mesoescutro são castanho-claros.

Lado inferior castanho, coxas avermelhadas com áreas pálidas em seu meio, ernas I e II castanhas, pernas III castanhas, tífias páli-



*Fulvius minimus* n. sp.: Fig. 20 – fêmea, holótipo; Fig. 21 – pênis; Figs. 22 e 23 – parâmetro esquerdo; Figs. 24 e 25 – parâmetro direito; Fig. 26 – pigóforo; Fig. 27 – unhas.