

quanto larga, revestida de cerdas longas, erectas, vértice arredondado, olhos deprimidos, distantes do pronoto por espaço equivalente a pouco mais que sua largura; antena cilíndrica, situada no terço inferior do olho, segmento I aproximadamente tão longo quanto à largura do vértice, segmento II engrossado para o ápice, cerca de quatro vezes mais longo que o I, segmentos III e IV finos. Todos revestidos de pêlos curtos; rostro alcançando as coxas III, segmento I grosso e largo, epifaringe explanada, larga, jugo grande, visto de cima, lora longa, gena inclinada, revestida com cerdas longas, largamente sulcada anteriormente.

Pronoto fortemente estreitado para a frente, colar bem marcado, calos obsoletos, margem posterior um pouco reintrante no meio, ângulos umerais arredondados; mesoescuto largamente exposto, escutelo longo, saliente, afilado para o ápice.

Hemiélitros nitidamente estreitados no meio (ao nível da faixa pálida), cúneo tão longo largo, embólio muito estreito, membrana biareolada.

Abdome peciolado na base, piloso, fêmures e tibiás com minúsculas granulações esclerosadas e cerdas longas, de comprimento igual ou maior que o diâmetro desses segmentos.

Espécie tipo do gênero: *Herdonoides paulistanus* n. sp.

Gênero muito próximo de *Herdonius* Stål, 1860 e de *Herdonisca* Carvalho e Ferreira, 1974, diferenciando-se do primeiro pela ausência de espinho no escutelo e do segundo pela ausência de pêlos escamiformes.

O nome genérico é alusivo á sua semelhança com *Herdonius* Stål.

***Herdonoides paulistanus* n. sp.**

(Figs. 17 - 22)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 8,0 mm, largura na porção mais estreita do hemiélitro 1,7 mm. **Cabeça:** comprimento 1,6 mm, largura 1,6 mm, vértice 0,72 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,7 mm; II, 3,0 mm; III, 1,0 mm; IV, 0,4 mm. **Pronoto:** comprimento 1,2 mm,

largura na base 1,8 mm. **Cúneo:** comprimento 0,44 mm, largura na base 0,44 mm (holótipo).

Coloração geral preto a castanho-escuro com áreas pálidas; cabeça, pronoto e escutelo mais escuros, opácos, extrema base do segmento I da antena mais pálido, mancha no porção anterior da lora e da gena, debaixo do olho pálidas hemiélitro castanho, com faixa branca na sua porção mais estreita (alargada para fóra), áreas basal e apical mais escuras, cúneo pálido na margem basal externa, membrana preta.

Lado inferior do corpo castanho, abdome preto, pálido inferiormente nos segmentos II e III.

Caracteres morfológicos como citados para o gênero.

Genitália: vésica do edeágo (Fig. 19) com lobos, gonóporo largo, canal seminal distal grosso e longo, extremidade do lobo maior com dentículos como mostra a ilustração. Parâmero esquerdo (Fig. 20) longo, falciforme, com cerdas curtas no dorso. Parâmero direito (Fig. 21, 22) menor, com extremidade apical afilada.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, São Paulo, Brasil, Campos do Jordão, 23.XII.1944, F. Lane col., na coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.

O nome específico é alusivo ao Estado de São Paulo.

***Horciasoides ouopretanus* n. sp.**

(Figs. 23 - 26)

Caracterizada pela coloração vermelha salpicada de pontos pálido-amarelados e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 5,4 mm, largura 2,6 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 1,1 mm, vértice 0,44 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,8 mm; II, 2,4 mm; III e IV mutilados. **Pronoto:** comprimento 1,0 mm, largura na base 2,3 mm. **Cúneo:** comprimento 0,44 mm, largura na base 0,30 mm (holótipo).

Coloração geral vermelha salpicada de pontos pálido-amarelados no clavo e no cório; cabeça castanha, clípeo vermelho, antena pálida e castanha, ápice do segmento II negro, rostro castanho.