



Prepops ubirajarai n. sp.: Fig. 39 – macho, holótipo; Fig. 40 – vésica do edeago; Fig. 41 – parâmetro esquerdo; Fig. 42 – parâmetro direito.

1,9 mm. **Cabeça:** comprimento 0,4 mm, largura 1,1 mm, vértice 0,50 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,8 mm; II, 1,8 mm; III, 1,2 mm; IV, 0,8 mm. **Pronoto:** comprimento 1,1 mm, largura na base 1,7 mm. **Cúneo:** comprimento 1,04 mm, largura na base 0,50 mm (holótipo).

Coloração geral preta com áreas lúteo-avermelhadas; região mediana do collar, área dos calos e faixa longitudinal mediana no disco (alcançando a margem posterior e avançando sobre o mesoescuto) lúteo-avermelhadas.

Lado inferior do corpo e coxas lúteo-avermelhados, abdome fusco a preto, fêmures e tíbias pretos.

Corpo com pruinossidade prateada, rostro alcançando o meio do mesoesterno, fêmures e tíbias muito piloso, comprimento das cerdas destas últimas tão longos ou mais longos que seu diâmetro, antena com pêlos curtos, collar largo, cúneo longo.

Macho: idêntico à fêmea em aspecto geral, faixa longitudinal lúteo-avermelhada ao longo do pronoto e collar estreitada, propleura citrina apenas superiormente, mesoesterno, meso e metapleuras negro, abdome preto, coxas lúteo-avermelhadas, pernas pretas. Comprimento 6,1 mm, largura 1,6 mm, vértice 0,40 mm.

Genitália: vésica do edeago (Fig. 40) com lobos membranosos, um deles com dentículos e um espículo esclerosado bem nítido. Parâmetro esquerdo (Fig. 41) fortemente curvo, extremidade apical bifurcada, cerdas dorsais longas. Parâmetro direito (Fig. 42) curto, mais grosso no meio, extremidade apical afilada.

Holótipo: fêmea, Ribeirão Preto, Fazenda Iracema, São Paulo, Brasil, II.XII.1956, Barreto col., na coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. **Parátipo:** macho, mesmas indicações que o tipo, na coleção do autor.

Diferencia-se das outras espécies de *Prepops* Reuter, pela coloração do corpo, comprimento do rostro e do cúneo e pela morfologia da genitália do macho.

Esta espécie é alusiva ao colega Ubirajara Martins de Souza, em homenagem pelo seu trabalho na família Cerambycidae (Coleoptera).

Saileria sulina n. sp.

(Figs. 43 - 46)

Caracterizada pela coloração do corpo salpicada de verde nos hemiélitros e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 3,6 mm, largura 1,4 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,28 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,4 mm; III, 0,8 mm; IV, 0,4 mm. **Pronoto:** comprimento 0,3 mm, largura na base 0,9 mm. **Cúneo:** comprimento 0,60 mm, largura na base 0,32 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada salpicada de manchas verdes nos hemiélitros, com