



Antias boumilae n.sp.: Fig. 10 - macho, holótipo; Fig. 11 - pênis; Fig. 12 - parâmero esquerdo; Fig. 13 - parâmero direito.

(Fig. 9) característico, com duas pontas apicais.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, Venezuela, Gu Hato, Las Lajas, 24-26.VI.1966, F. Fernandez Yopez e C.J. Rosales, na coleção do Museu de Entomologia F. Fernandez Yopez, Escola de Agricultura, Maracay, Inst. Zool. Agrícola, Universidade Central.

Difere das demais espécies pela mancha pálida grande no hemiélitro, pela cabeça castanho-clara e pela morfologia da vésica do edeágo.

O nome específico é alusivo ao país de origem do tipo.

***Antias boumilae* n.sp.**

(Figs. 10 - 13)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 4,2 mm, largura 2,2 mm. *Cabeça*: comprimento 0,2 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,30 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,4 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,3 mm. *Pronoto*: comprimento 0,9 mm, largura na base 1,6 mm. *Cúneo*: comprimento 0,80 mm, largura na base 0,60 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada com áreas castanho-escuras (negras) e brancacentas; cabeça pálida, fronte e búcula pretas, olhos e antenas pretos, segmentos I, III e IV pálidos.

Pronoto castanho-escuro anteriormente e dos lados, mancha grande no meio do disco, ângulo umerais e extrema margens posterior pálido; escutelo negro com mancha branca grande alcançando a extremidade apical.

Hemiélitros pálidos-amarelados, porção basal do clavo, mancha semicircular subapical