



Hyaliaodocoris meridanus n.sp.: Fig. 40 - macho, holótipo; Fig. 41 - pênis; Fig. 42 - parâmetro esquerdo; Fig. 43 - parâmetro direito.

Lado inferior do corpo e pernas pálido-amarelados.

Olhos muito grandes, situados no meio da cabeça, pronoto visivelmente estreitado para a frente, colar largo, embólio muito largo, fratura cuneal profunda, cúneo arredondado na base externamente, membrana longa, rostro alcançando as coxas III.

Genitália: pênis (Fig. 41) do tipo *Hyaliadini*, com lobos membranosos e ápice como mostra a ilustração. Parâmetro esquerdo (Fig. 42) bastante curvo, dilatado na porção subapical, terminado em ponta esclerosada em com cerdas dorsais. Parâmetro direito (Fig. 43) muito pequeno, simples, com extremidade apical pontuda.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: Venezuela, Merida, Cutata, 21.II.1969, J e B. Bechyně leg., na coleção do

Museu de Entomologia F. Fernandez Yopez, Escola de Agricultura, Maracay. **Parátipo:** macho, mesmas indicações que o tipo, 18.II.1969, na coleção do autor.

Defere das outras espécies do gênero pela coloração do cúneo e pela morfologia dos parâmetros do macho.

O nome específico é alusivo a Província de origem dos tipos.

***Pliniella columbiensis* n.sp.**

(Figs. 44 - 48)

Caracterizada pela coloração da cabeça e pela morfologia da genitália do macho.

Fêmea: comprimento 3,6 mm, largura 1,3 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,30 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 0,9 mm; III, 0,5 mm; IV mutilado. **Pronoto:** comprimento 0,4