

# Sobre um Curioso Gênero e Espécie Novos de Hallodapini, Phylinae da África (Hemiptera)

JOSÉ C. M. CARVALHO\*

Museu Nacional, Rio de Janeiro, RJ

*Manuscrito aceito para publicação em 12 de julho de 1988*

## INTRODUÇÃO

O autor recebeu há alguns anos atrás material de Miridae (Hemiptera), colecionado pelo falecido colega Denys Leston, quando professor de entomologia na *Universidade de Tafo, Ghana, África*.

Entre o referido material, ficou retido, para estudo posterior, um curioso gênero novo da tribo Hallodapini, Phylinae, Miridae (Hemiptera). O gênero e espécie envolvidos possuem a tibia posterior foliácea, com uma fileira de minúsculos dentes longitudinais em quase toda sua extensão. Ao rever trabalhos publicados por especialistas no grupo referentes ao continente africano, foi possível verificar tratar-se de gênero e espécie novos, descritos a seguir.

As ilustrações que figuram no texto são de autoria de Maria Lilia Gomide da Silva e Luiz Antônio Alves Costa, sob a supervisão do autor.

### *Lestonisca* n. gen.

Phylinae, Hallodapini. Corpo alongado, liso, opaco, com pilosidade curta, esparsa, adpressa.

Cabeça sulcada no vértice, olhos granulosos, contíguos ao pronoto, margem posterior emarginada, fronte arredondada, clipeo levemente saliente, arredondado superiormente,

lados da cabeça normal; rostró alcançando o ápice das coxas III; antena grossa, cilíndrica, segmento I de comprimento aproximado à largura da cabeça, segmento II engrossado, segmentos III e IV ausentes, com pilosidade curta e densa.

Pronoto recoberto por pêlos adpressos, prateados e minúsculos espinhos pretos, margem posterior reintrante no meio, calos pouco salientes, colar largo; mesoescuto descoberto, escutelo proeminente, elevado no meio sob forma de ponta rombuda.

Hemiélitros opacos, embólio estreito, fenda cuneal oblíqua, cúneo aproximadamente duas vezes mais longo que largo na base, membrana glabra.

Lado inferior do corpo com peritrema ostiolar saliente, fêmures com espinhos curtos, tibiás III foliáceas, achatadas, mais estreitas para as extremidades, região mediana com uma fileira longitudinal de minúsculos pontos, recoberta de pêlos ou espinhos curtos (Figs. 2, 3).

Espécie tipo do gênero: *Lestonisca tafoensis* n. sp.

Difere dos demais gêneros de Hallodapini pela morfologia das tibiás posteriores, bem como pelos minúsculos espinhos que recobrem o pronoto.

O nome genérico é dado em homenagem ao colega falecido, Denis Leston, coletor dos exemplares, de cuja companhia o autor pode privar em Londres, período em que trabalharam juntos nos hemípteros da Inglaterra.

\* Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).