



Fig. 3 - *Ceratocapsus nigropiceus* Reuter, macho, lectótipo.

castanhos, tíbias III com laivos avermelhados no meio (exemplar sem abdome).

Corpo revestido de pêlos curtos prateados e pêlos longos, semierectos, esparsos, mais longos no clavo, corpo densamente pontuado.

No exemplar fêmea, com rostro e pernas mutilados, as pernas são todas castanhas.

Exemplares estudados: macho (?) sntipo, Mandeville, Jan. Apr., 06, Van Duzee col., E.P. Van Duzee collection, Academia de Ciências da Califórnia; fêmea, semelhante ao macho, Montego Bay, mesmas indicações.

Segundo Van Duzee: "Balaclava, four examples; Montego Bay, one example. Dr. Uhler described this genus in 1889 as *Melinna* and Mr. Kirkaldy renamed it *Hypereides* in 1903. Dr. Reuter however considers it identical with his genus *Ceratocapsus* published in 1875".

A espécie é também do grupo com o corpo fortemente pontuado. O sntipo macho é designado como lectótipo.

***Dagbertus olivaceus* (Reuter, 1907)**

Lygus olivaceus Reuter, 1907:6;

id. Van Duzee, 1907:31;

id. Knight, 1917:599, Fig. 181; id. 1918:45;

Dagbertus olivaceus Kelton, 1955:285, figs.;

Kelton, 1974:378 (como sinônima de

Dagbertus hospitus (Distant, 1893); id.

Carvalho & Fontes, 1983:158

(levantam dúvidas sobre sinonímia); id.

Henry, 1985:1122 (lectótipo)

(Figs. 4-7)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 3,4 mm, largura, 1,4 mm. *Cabeça:* comprimento 0,2 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,30 mm. *Antena:* segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,2 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,5 mm. *Pronoto:* comprimento 0,5 mm, largura na base 1,5 mm. *Cúneo:* comprimento 0,50 mm, largura na base 0,40 mm (sntipo).

Coloração geral pálido-esverdeada com áreas castanhas a castanho-avermelhadas; olhos castanhos, mancha pequena na comissura corial negra, ápice do cúneo castanho-avermelhado, membrana fusca.

Lado inferior pálido-amarelado, região external com faixa castanho-escura longitudinal, abdome e pernas pálidos.

Tíbias III com espinhos pouco mais longos que sua grossura, antenas e corpo com pêlos curtos, adpressos, rostro alcançando as coxas III.

Genitália: véscia do edeágo (Fig. 5) com estrutura peculiar, um espículo central e lobos recobertos de dentículos esclerosados. Parâmero esquerdo (Fig. 6) curvo, com cerdas do lado dorsal e ponta subapical nftida. Parâmero direito (Fig. 7) menor, com pequena ponta subapical.

Fêmea: semelhante ao macho em coloração e aspecto geral.

Exemplares estudados: macho, Mandeville, Jamaica, Jan.-Apr., 1906, Van Duzee, E.P. Van Duzee col., CAS.; machos (?) e fêmea, sntipos, mesmas indicações que macho acima.

Segundo Van Duzee: "Not uncommon on the southern side of the Island. I took it near the Constant Spring Hotel, at Mandaville, Balaclava and Montego Bay. It looks like a small compact *invictus*". Coube Henry 1985:1123, estabelecer definitivamente o lec-