

sal atrás dos calos, afilado para a frente, olhos pequenos, situados no meio da cabeça, segmento I da antena globoso, mais grosso que o II, vértice reto posteriormente, região atrás dos olhos concava, rostro mutilado.

*Macho*: desconhecido.

*Exemplar estudado*: fêmea, holótipo, Mandeville, Jan. Apr., 06, Van Duzee col., Spec. Typ. E.P. Van Duzee collection, Academia de Ciências da Califórnia.

Segundo Van Duzee: "Mandeville, March 31 st, one example".

O autor só teve oportunidade de ver o exemplar fêmea desta espécie, bastante curioso por ter os olhos situados anteriormente na cabeça. A presença de aréolas esclerosadas na membrana todavia incluem a espécie no gênero, bem como a margem posterior do pronoto biconvexa.

***Hyalopsallus diaphanus* (Reuter, 1907)**

*Atomoscelis diaphanus* Reuter, 1907:24;

id. Van Duzee, 1907:28; id. Carvalho,

1958:14; *Hyalopsallus diaphanus*

Carvalho & Schaffner, 1974:19, Figs. 4-7

(Fig. 21)

Caracterizada pela coloração do corpo.

*Fêmea*: comprimento 3,6 mm, largura 1,4 mm. *Cabeça*: comprimento 0,2 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,40 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,1 mm; II, 0,8 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,3 mm. *Pronoto*: comprimento 0,5 mm, largura na base 1,2 mm. *Cúneo*: comprimento 0,60 mm, largura na base 0,40 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo pálido-esverdeada com os hemiélitros transparentes (hialinos, diáfanos), pêlos do pronoto e escutelo retos, ápice (extremo) do clavo, fêmures (com numerosos) e tÍbias com espinhos tendo pôn- tos negros na base.

*Macho*: descrito em Carvalho & Schaffner, 1974:19.

*Exemplar estudado*: fêmea, Mandeville, holótipo, Academia de Ciências da Califórnia, Jan.-Apr. 906, Van Duzee, E.P. Van Duzee collection.

Van Duzee menciona: "Mandeville, April 2 nd, one example". Na opinião do autor, Carvalho & Schaffner descreveram corretamente novo gênero para abranger a espécie.




Fig. 21 - *Hyalopsallus diaphanus* (Reuter): fêmea, holótipo.

***Keltonia sulphurea* (Reuter, 1907)**

*Psallus sulphureus* Reuter, 1907:23;

id. Van Duzee, 1907:27;

*Pseudatomoscelis tuckeri* Poppius, 1911:86;

*Psallus conspurcatus* Blatchley, 36:16;

*Keltonia sulphurea* Knight, 1966:591

(Para mais sinonímia veja Henry & Froeschner, 1985:469)

Esta espécie foi recolhida por Van Duzee, "Taken in numbers along the roadside at Rock Fort. It is a pale yellow species with a black point on the apex of the cuneus and a dot a little behind this on the margin of the maculate menbrane".

Embora seja uma espécie comum na