

Macho: comprimento 3,6 mm, largura 1,4 mm. **Cabeça:** comprimento 0,3 mm, largura 0,8 mm, vértice 0,30 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,5 mm, II, 1,2 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,5 mm. **Pronoto:** comprimento 0,5 mm, largura na base 1,2 mm. **Cúneo:** comprimento 0,40 mm, largura na base 0,32 mm (exemplar Mandeville).

Coloração geral do corpo variável de castanho-escuro a castanho com cúneo avermelhado ou flavo; pronoto, base do escutelo e ápice do segmento II da antena pretos a mais escuros, cúneo vermelho com extremo ápice pálido, membrana fusca, nervuras pálidas, mancha no meio do disco (entre e posterior aos calos), margem posterior do pronoto, região apical do escutelo (exceto pequena faixa mediana) pálidas.

Lado inferior do corpo com região esternal castanho-escuro, propleura inferiormente e peritrema ostiolar pálidos, fêmures castanhos, tíbias pálidas com espinhos negros.

Corpo superiormente revestido com pêlos lanosos adpressos, prateados sob luz incidente, rostro, longo, alcançando o IV segmento abdominal.

Genitália: vésica do edéago conforme mostra a ilustração (Fig. 34), tendo um campo de espinhos a esquerda do gonóporo e um espículo esclerosado do lado direito. Parâmero esquerdo (Fig. 35) e Parâmero direito (Fig. 36) como mostra a ilustração, o esquerdo com minúsculos pontos esclerosados na extremidade.

Fêmea: com aspecto geral e coloração do macho, vértice 0,34 mm.

Exemplares estudados: 39 exemplares machos e fêmeas, Kingston (2), Pt. Antonio (2), Montego Bay (1) e Mandeville (34), Jan. Apr., 1906, Van Duzee col., E.P. Van Duzee collection, Academia de Ciências da Califórnia.

Segundo Van Duzee: "Common about Mandeville and Balaclava. I also took it at Rock Fort near Kingston. I have received this species from British Guiana and the Island of Trinidad and Distant, who described it as a *Lygus*, records it from Mexico and Central America". Mais adiante, referindo-se a var. *rufocuneatus* Reuter, 1907, assim se refere: "Differs from the typical form in being paler with a red cuneus. I found it abundant, particularly about Mandeville". Ainda mais

adiante, referindo-se a *flavocuneatus* diz: "Two examples taken at Hope Gardens, March 26th. Very near *cuneatus* of which. Dr. Reuter thinks it may prove to be a variety".

O autor considera a var. *rufocuneatus* e a espécie *flavocuneatus* sinônimas de *testaceus* (Stål, 1860). Os dois exemplares da última espécie colecionadas em Hope Gardens não passam de uma variedade mais pálida da espécie de Stål.

Os lectótipos acham-se indicados nos exemplares.

Proba aeruginata (Bergroth, 1910)

n. comb. Lygus aeruginosus

Reuter, 1907:5; id. Van Duzee, 1907:31;

Lygus aeruginatus

Bergroth, 1910:68 (n. n. *Lygus aeruginosus*)

Reuter precoc. *Lygus aeruginosus*

Berg, 1892); id. Carvalho, 1959:115.

(Fig. 37)

Caracterizada pela mancha vermelha-transversal frente aos calos e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 3,8 mm, largura 1,6 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,9 mm, vértice 0,42 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,0 mm; III, 0,5 mm; IV, 0,3 mm. **Pronoto:** comprimento 0,6 mm, largura na base 1,4 mm. **Cúneo:** comprimento 0,40 mm, largura na base 0,36 mm (sintipo).

Coloração geral pálido-esverdeada com áreas negras e vermelhas; olhos, ápice do segmento II da antena e segmentos III e IV negros; clipeo e mancha transversal anterior aos calos vermelhos; meio da margem posterior do disco e duas faixas no escutelo (uma de cada lado), sutura clavo-escutelar, claval e comissura corial mais escuras.

Lado inferior do corpo pálido, abdome com faixa longitudinal lateral vermelha. Corpo densamente pontuado, translúcido, rostro alcançando as coxas II ou III.

Fêmea: desconhecida.

Exemplares estudados: macho, sintipo, Mandeville, Jamaica, Jan.- Apr., 1906, Van Duzee, E.P. Van Duzee col., CAS.

Segundo Van Duzee: "...two examples. A shiny little species with much the aspect of an *Orthops*".

O autor designa um dos exemplares machos como *lectótipo*. Genitália do macho não dissecada.