



Fig. 51 - *Zanchisme illustris* Reuter, fêmea, lectótipo.

Mandeville, Jan. Apr. 06, Van Duzee col., Spec. typ., E.P. Van Duzee collection, Academia de Ciencias da California.

A espécie descrita por Carvalho, 1986:225, Fig. 29, tratada por *Chrysodasia oculata* (Reuter 1907) é realmente uma nova espécie desse gênero e deverá receber o nome de *Chrysodasia jamaicana* n. sp.

Segundo Van Duzee, 1907:32, "Mandeville, April 1st, one example".

Zanchisme illustris Reuter, 1907

Zanchisme illustris Reuter, 1907:11;

id. Van Duzee, 1907:28;

id. Carvalho, 1958:153.

(Fig. 51)

Caracterizada pelo espinho do lobo anterior do pronoto e pela coloração e tamanho do corpo.

Fêmea: comprimento 3,4 mm, largura 1,0 mm. **Cabeça:** comprimento 0,4 mm, largura 0,8 mm, vértice 0,40 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,16 mm; II, 0,5 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,3 mm. **Pronoto:** comprimento 0,6 mm, largura na base 0,7 mm. **Cúneo:** comprimento 0,30 mm, largura na base 0,30 mm (lectótipo).

Coloração geral do corpo castanha; olhos pretos, hemíélitos com áreas escamosas prateadas na base e no meio (ao nível do meio do clavo), área do endocório pruinosa, cúneo castanho-avermelhado, membrana fusca.

Pronoto fortemente constricto no meio, porção anterior com dois tubérculos (espinhos) elevados, afilados para o ápice, disco proeminente, liso, vértice marginado, olhos deprimitidos, mesoescudo caido para trás, escutelo pequeno, porção posterior do hemíélito nitidamente mais larga.

O lado inferior do corpo é nitidamente castanho e o abdome tendendo ao vermelho, tibias pálidas na porção apical e gula nitidamente avermelhada.

Rostro alcançando o meio do mesoesterno, antena do tipo Ceratocapsini Van Duzee, abdome com pelos longos inferiormente.

Macho: desconhecido.

Exemplares estudados: fêmea, lectótipo (danificada de um lado), Jan. Apr. 906, Van Duzee, E.P. Van Duzee col. Academia de Ciências da Califórnia com o rótulo de holótipo.

Van Duzee menciona a espécie: "Balaclava, April 5th, two examples: A neat little species with much the aspect of a small *Pilophorus*. This generic name was substituted for Reuter's preoccupied name *Schizonotus* by Mr. Kirkaldy in 1904".

O exemplar macho da espécie encontra-se na coleção do Museu de Zoologia da Universidade de Helsinki onde recebeu o rótulo de "typus".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERG, C., 1891-1892, Nova Hemiptera faunaram Argentinae et Uruguayensis. Typ. Pauli E. Coni et Filiorum, Bonariae, 112 p.
- BERGROTH, E., 1910, On some Miridae from French Guiana, Ann. Soc. Ent. Belg., 55:184-189.
- BLATCHLEY, W.S., 1926, Heteroptera or true bugs of Eastern North America, with especial reference to the faunes of Indiana and Florida. The Nature Pub. Comp., Indianapolis. 1.116 pp., 215 Figs.
- CARVALHO, J.C.M., 1952, On the major Classification of the Miridae (Hemiptera). (With keys to the