

Parátipos: mesma indicação que o tipo, na coleção do autor.

Difere das outras espécies do gênero pela morfologia da genitália do macho.

O nome científico é dado em homenagem a um de seus coletores.

***Pseudoloxops habaranensis* n. sp.**

(Figs. 16 – 18)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 2,4 mm, largura 1,0 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,28 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 1,0 mm, III, 0,3 mm, IV, 0,2 mm. **Pronoto:** comprimento 0,40 mm, largura na base 0,30 mm (holótipo).

Colocação geral do corpo avermelhada com áreas pálido-amareladas; cabeça e olhos vistos de cima negros, lados da cabeça avermelhados; antena pálida, segmentos II e III negros na região apical.

Pronoto pálido-amarelado, colar com manchas avermelhadas dos lados, mesoescuto vermelho, pálido dos lados, escutelo avermelhado.

Hemiélitros vermelhos na base e no ápice, pálidos na região central (entre o ápice do escutelo e o ápice do clavo), região apical do cório com manchas pálidas, cuneo pálido na base, vermelho no ápice, membrana fusca.

Lado inferior do corpo pálido-amarelado, coxas pálidas, exceto margem anterior da I, fêmures avermelhados no ápice, tfbias pálidas.

Corpo recoberto por pubescência semirecta, rostro alcançando as coxas III, antena com pêlos curtos, tfbias posteriores com espinhos um pouco mais longos que a grossura das mesmas.

Genitália: pênis (Fig. 16) com um espículo esclerosado alongado e fino após e gonóporo, teça terminada em ponta. Parâmero esquerdo (Fig. 17) muito curvo no braço principal, lobo basal saliente, coberto por cerdas curtas. Parâmero direito (Fig. 18) menor, simples, também com cerdas superficiais.

Fêmea: desconhecida.

Hótipo: macho, SRI-LANKA, Pol. District, 10 mi E of Habarana, black light, 650 ft, 12 November 1976, G. F. Hevel, R. E. Dietz, S. Karunaratne. D. W. Balassoriya col. na coleção do Museu de História Natural dos Estados Unidos da América, Washington, D. C.

Difere das outras espécies do gênero pela morfologia da genitália do macho.

O nome específico é alusivo à localidade de Habarana, Sri-Lanka.

***Srilankia* n. gen.**

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo pequeno, liso, revestido de pubescência densa, semirecta.


Cabeça tendo olhos grandes, ocupando quase toda sua extensão quando vista de cima, fronte normal, vértice arredondado, sem carena; clípeo arredondado na frente, comprimido dos lados; antena com segmento I mais curto que a largura no vértice, segmento II cerca de 8 vezes mais longo que o I, segmento III quase tão longo quanto o II, segmento IV pequeno; rostro alcançando as coxas III, segmento I praticamente dentro da búcua.

Pronoto com colar deprimido, margem posterior largamente arredondada, calos obsoletos; mesoescuto exposto; escutelo plano.

Hemiélitros com embólio pouco largo, cuneo mais longo que largo na base, membrana lisa, biareolada.

Lado inferior do corpo com peritrema ostiolar desenvolvido, fêmures III bastante mais grosso e maior que os outros, tfbias com espinhos curtos, do mesmo comprimento da largura da tibia.

A antena possui pêlos curtos.



Pseudoloxops habaranensis n. sp.: Fig. 16 – pênis; Fig. 17 – parâmero esquerdo; Fig. 18 – parâmero direito.