

Colimacoris nicaraguensis sp. n.

(Fig. 1).

Caracterizada pela coloração do corpo.

Fêmea: (Medidas em mm). Corpo, comprimento 4,5; largura 1,9. Cabeça: comprimento 0,2; largura 0,8; vértice 0,36. Antena: segmento I, comprimento 0,8; II, 1,0; III, 0,7; IV, 0,5. Pronoto: comprimento 0,8; largura na base 1,5. Cúneo: comprimento 0,50; largura na base 0,50 (holótipo).

Coloração geral do corpo pálido-amarelada a ocrácea; meio dos calos, faixa mediana no disco e margem posterior (no meio e duas machas laterais), escutelo brancacentos; ápice do segmento II da antena, região basal do hemiélitro mancha semilunar no meio do cório, mesoscuto (exceto no meio), nervuras e comissura claval, ápice da comissura corial e margem interna do cúneo negras. Num ejemplar a frente é negrecida.

Lado inferior do corpo pálido-amarelado.

Rostro alcançando o ápice das coxas III.

Características morfológicas como citadas para o gênero.

Macho: desconhecido.

Holótipo: fêmea, NICARAGUA, 50 Km E. Matagalpa, El Coyolar, 20.XI.91, 800 m, en pasto espontaneo, J.M. Maes, S. Hue e X. Palacios Col., na coleção S.E.A. (Museu Entomológico). **Parátipo:** mesmas indicações que o tipo, en maleza en cafetal, mesmos colecionadores, na coleção do autor.

Aproxima-se muito de *Colimacoris salvadorensis* Carvalho, 1989, diferenciando-se pela coloração do pronoto e do escutelo.

O nome específico é alusivo á Nicaragua, onde os exemplares foram colecionados.

Figs. 2-5 - *Eccritotarsus micheli* sp. n., macho, holótipo; 3 - penis; 4 - parâmero esquerdo; 5 - parâmero direito.