

## ***Nicaraguacoris* gen. n.**

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo ovóide, grosseira e esparsamente pontuado, revestido de pêlos longos, erectos.

Cabeça com olhos contíguos ao colar, margem posterior do vértice levemente carenada e com sulco mediano leve no meio, fronte redonda, clipeo mais ou menos bem delineado; segmento I da antena com pêlos curtos e uma cerda erecta, pouco mais grosso que o II, que é revestido de pêlos curtos, III e IV mutilados; rostro com segmento I mais grosso que os demais, atíngido as coxas III.

Pronoto com colar deprimido, calos obsoletos, escutelo pequeno, ângulos umerais salientes.

Hemiélitros abaulados. Braquíptero, segmentos terminais do abdome vistos de cima, cúneo inesistente, membrana obsoleta, pequena.

Lado inferior com fêmures normais, providos de pêlos curtos, tíbias com pilosidade densa, quase tão comprida como a largura de uma tibia, tarsos longos, paraempódio convergente para o ápice.

Espécie tipo: *Nicaraguacoris punctatus* n. sp.

Difere dos demais gêneros de Orthotylinae pelo seu braquipterismo e corpo grosseira e esparsamente pontuado.

O nome genérico é alusivo ao país de coleta do material.

### ***Nicaraguacoris punctatus* n. sp.**

(Fig. 6).

Caracterizada pela coloração única do corpo.

**Fêmea:** (Medidas em mm). Corpo, comprimento 2,4; largura 1,2. **Cabeça:** comprimento 0,3; largura 0,6; vértice 0,30. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3; II, 1,1; III e IV mutilados. **Pronoto:** comprimento 0,5; largura na base 0,8.

Coloração geral do corpo pálida-cinamomea.

Figs. 7-10 - *Pamillia nicaraguensis* sp. n., macho, holótipo; 8 - penis; 9 - parâmero esquerdo; 10 - parâmero direito.