



Рис. 12—15. *Myrmecophyes variabilis* sp. n.

12 — Азербайджан, Нахичеванская АССР, ♂; 13 — там же, ♀; 14 — Иран, ♂; 15 — там же, ♀.

17 IV 1902 (Ангер), 1 ♀. Темя у ♂ в 2.2, у ♀ в 1.7—1.9 раза шире глаза. Ширина головы у ♂ в 1.7, у ♀ в 2.2—2.6 раза больше, а ширина переднеспинки у ♂ в 1.36, у ♀ в 1.7—1.9 раза больше длины 1-го членика усиков. Длина щитка ♂ равна, а у ♀ в 1.3 раза больше длины общего шва надкрылий. Длина тела ♂ 2.4, ♀ 2.9—3.5 мм.

Мы включаем указанные экземпляры из Дагестана, Зуванда, Ирана и Туркмении в число паратипов и воздерживаемся от выделения для них подвидов.

***Myrmecophyes nasutus* Drapolyuk, sp. n. (рис. 40—45, 52, 53).**

Тело ♂ черное, матовое, брюшко более блестящее. 1-й членик усиков сильно вздут, отношение его толщины к длине — 1:3, основание его в виде «ножки», равной $\frac{1}{5}$ общей длины членика.