

5. — Paramères de forme simple. Baguettes de la vésica non divisées et non denticulées. Poils semi-érigés noirs, bruns ou clairs et poils couchés squamiformes, clairs ..... *Melanotrichus* Reuter, 1865
- Paramères de forme compliquée. Baguettes de la vésica divisées et denticulées ou non ..... 6
6. — Baguettes de la vésica non divisées et non denticulées. Poils semi-érigés bruns, poils couchés blanchâtres, non squamiformes ..... *Pinocapsus* Southwood, 1953
- Baguettes de la vésica divisées et denticulées. Poils semi-érigés noirs, rarement clairs : dans ce cas les poils couchés sont squamiformes ..... *Neopachylops* E. Wagner, 1957

### *Orthotylus armoricanus* n. sp.

Habitus, coloration, pubescence : fig. 1, ♂, et fig. 3, ♀. D'un vert ou d'un vert-jaunâtre. Membrane d'un gris-brunâtre ; nervures des cellules rosâtres à rougêtres. Antennes et pattes jaunâtres. Face dorsale avec des poils semi-érigés nombreux, assez longs et assez forts, bruns ou d'un brun foncé, sans poils couchés, sans poils squamiformes. Antennes garnies de poils fins nombreux, presque couchés ; article I avec, en plus, quelques soies au moins aussi longues que l'épaisseur de l'article. Epines des tibias d'un brun clair, plus longues que l'épaisseur du tibia ; extrémité munie de quelques épines plus fortes ; tibias antérieurs avec, en plus, une rangée de soies formant un peigne (fig. 7). Rostre atteignant à peine les hanches intermédiaires, noir ou noirâtre à l'extrémité ; articles 3 et 4 épaissis, chacun d'eux plus court et plus épais que l'article 2 (fig. 2, 4).

*Dimensions, mensurations.* — ♂ : longueur : 3,2 mm ; plus grande largeur : 1 mm ; longueur totale des antennes : 2,1 mm ; I : 0,25 mm, II : 1 mm, III : 0,5 mm, IV : 0,35 mm. Article II 2 fois plus long que le III, le III presque 2 fois plus long que le IV. Largeur du pronotum : 1 mm. Largeur de la tête : 0,78 mm. Vertex : 2,08 fois plus grand que le diamètre de l'œil. ♀ : longueur : 3 mm ; plus grande largeur : 1,1 mm ; longueur totale des antennes : 1,7 mm ; I : 0,2 mm, II : 0,85 mm, III : 0,4 mm, IV : 0,25 mm. Article II 2 fois plus long que le III, le III presque 2 fois plus long que le IV. Largeur du pronotum : 0,9 mm. Largeur de la tête : 0,8 mm. Vertex : 2,7 fois plus grand que le diamètre de l'œil.

*Genitalia* ♂. — Paramères : figures 8-10 : paramère droit ; 11-13 : paramère gauche. La forme, très particulière, des paramères diffère nettement de celle observée chez *Pachylops prasinus*, *P. bicolor*, *P. major* et *P. fieberi*. Chez ces espèces (Wagner 1973), ils sont beaucoup plus simples. Leur aspect général est celui de nombreux *Orthotylinae*, notamment d'espèces des genres ou sous-genres suivants : *Hyoidea*, *Orthotylus* (*s. str.*), *Pinocapsus*, *Neopachylops*, *Globiceps*... Phallus : baguettes sclérifiées de la vésica : figure 14. Les baguettes sclérifiées de la vésica, typiques des *Orthotylinae*, sont ici nettement divisées et dentées. C'est le cas, par exemple, chez des espèces des genres ou sous-genres suivants : *Heterocordylus*, *Orthotylus* (*s. str.*), *Litocoris*... Elles sont plus simples, non ou peu divisées, non ou peu dentées chez des espèces des genres ou sous-genres : *Platycranus*, *Pseudoloxops*, *Melanotrichus*, *Canariocoris*, *Mecomma*, *Laurinia*, *Blepharidopterus*... et tout particulièrement chez les espèces du genre *Pachylops*.