

белые, очень редко пятна на груди и вершины бедер красноватые или буроватые. Средние, а у ♀ также передние голени в густом, но легко стирающемся белом опушении.

Эдеагус ♂ как на рис. 8.

Длина тела ♂ 4—4,5 мм, ♀ 3,5—4,2 мм.

Голотип ♂: Туркменская ССР, Испас, 70 км сев.-зап. Чарджоу, 31 V 1965, на *Ephedra strobilacea* Vge. (Кержнер). Паратипы: Туркменская ССР, Испас, 70 км сев.-зап. Чарджоу, 31 V 1965, 41 экз. (Кержнер, Логинова); Репетек, 18—22 VII 1900 и 12—14 VI 1905, 4 экз. (Ошанин); Шихин-Дере сев. Кара-Калы, 21 VI 1952, 1 ♀ (Бущик); Узбекская ССР: 70 км сев.-зап. Газли, Бухарская обл., 26 V 1965, 3 ♂♂, личинки (Кержнер); Термез, 22 V, 18 VI 1942, 2 ♂♂ (Кыриченко); Скобелев [Фергана], 12 VI 1919, 1 ♀ (Шестоеров); Таджикская ССР: Айвадж, 25 VII 1934, 1 ♂, 1 ♀ (Гуссаковский); кроме того, 4 экз. из предгорий Копетдага (сборы Ангера) в коллекции Зоологического музея Университета в Хельсинки.

Живет в песчаных пустынях Средней Азии на *Ephedra strobilacea* Vge.

ЗАМЕТКИ ПО СИНОНИМИИ И СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

Род *Stethoconus* Flor, 1861 относится к подсем. *Deraeocorinae* и к трибе *Clivinimini* (см.: Кержнер и Ячевский, 1964), а не к подсем. *Dicyrhinae*, куда его ошибочно продолжают включать. В Европе род




Рис. 9—11. *Stethoconus*, гениталии ♂ и форма коготков.

9а—9б — *S. cyrtopeltis* Flor, Гертовское болото близ Саблино: 9а — левый парамер, 9б — правый парамер; 10а—10в — *S. pyri* Mella, Саськоли Астраханской области: 10а — левый парамер, 10б — правый парамер, 10в — коготки; 11а—11б — *S.? japonicus* Schumacher, Нанкин: 11а — левый парамер, 11б — правый парамер.

представлен не одним видом, как принято считать, а двумя. Они различаются по следующей определительной таблице.

1 (2). Проксимальная треть 2-го членика усиков буро-черная. Темная перевязь на кориуме сужается по направлению к клавиусу. Левый парамер (рис. 9а) с более коротким чувствительным бугорком. Правый парамер (рис. 9б) почти палочковидный. — Известны лишь 3 находки: Латвия (Люде), Ленинградская обл. (Гертовское болото близ Саблино) и Финляндия (Hammastahdesta). Живет на болотах, очевидно (Schumacher, 1917), питается кружевницей *Stephanitis oberti* Kol. Изучен 1 ♂ из Ленинградской обл.

*S. cyrtopeltis* (Flor, 1860).

2 (1). Проксимальная треть 2-го членика усиков светлая или только с узким бурым кольцом в основании. Темная перевязь на кориуме везде одинаковой ширины. Чувствительный бугорок левого парамера длиннее (рис. 10а) и с другими мелкими отличиями. Правый парамер (рис. 10б) расширен к вершине. — Южная Европа, зап.