

росов), 2 ♀. К у н а ш и р: Дубовое, на *Betula*, 31 VIII, 1 IX 1973 (Кержнер), 8 ♂, в том числе голотип (31 VIII), 3 ♀; Серноводск, на *Ulmus pterinqua* и *Alnus japonica*, 26 VIII 1973 (Кержнер), 1 ♂, 1 ♀; Менделеево, 27 VIII, 8 IX 1971 (Нарчук), 1 ♂, 1 ♀; там же, 11 IX 1975 (Коротяев), 1 ♀.

Близок по строению гениталий к *Ph. longipennis* Fl. и *Ph. intricatus* Fl., отличается от обоих отсутствием черной полосы на заднем крае переднеспинки, более широким правым параметром, большим числом зубцов на правом крае гребенки эдеагуса.

Orthops nigrescens Kerzhner, sp. n. (рис. 23—29).

Тело сравнительно широкое и выпуклое. Голова и переднеспинка в очень коротких и тонких рыжеватых редких волосках. Надкрылья густо покрыты тонкими прямыми (при боковом освещении кажутся черными) и слегка изогнутыми и уплощенными серебристыми прижатыми волосками. Брюшко снизу в коротких светлых волосках.

Голова короткая, блестящая, грязно-буровато-желтая, наличник и широкая продольная полоса на лбу и темени, нередко доходящая до глаз, черные. Темя с невысоким килем по всему заднему краю, у ♂ в 1.3, у ♀ в 1.6 раза шире глаза. Усики тонкие, очень коротко опушены, 1-й членик усиков желтый, бурый или черный с очень узко желтоватым основанием; 2-й членик желтый или бледно-бурый, постепенно темнеющий до черного к вершине в дистальной $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{7}$, у голотипа и одной из ♀ он черный с узко желтоватым основанием и слегка более светлой срединной частью; 3-й и 4-й членики черные или темно-бурые. Хоботок темно-бурый с желтоватыми участками в месте соединения члеников, доходит до задних тазиков.

Переднеспинка приблизительно в 1.6 раза шире головы, вся поверхность ее, кроме шейного кольца и мозолистых возвышений в густой глубокой крупной пунктировке. Шейное кольцо матовое и плоское, его длина почти вдвое больше толщины 1-го членика усиков. Основной фон окраски грязно-желтовато-бурый, размытый черный рисунок занимает мозолистые возвышения, боковой и задний края и отдельные участки задней доли; у темных особей он захватывает почти всю переднеспинку, но шейное кольцо и узкая полоска на заднем крае всегда светлые.

Щиток высоко приподнятый, гладкий, сильно блестящий, черный, вершина его и обычно отходящая от нее вперед узкая продольная полоса светло-желтые. Основание щитка в густых светлых волосках, остальная поверхность его почти голая.

Надкрылья заметно заходят за вершину брюшка, одноцветно темно-бурые до почти черных, основание кунеуса с очень узкой светлой полосой, у неокрепших особей кунеус слегка красноватый. Наружная часть клавуса в едва различимой поверхностной крупной пунктировке, кориум слегка шероховатый, но без ясной пунктировки. Перепоночка серовато-черная, близ вершины кунеуса с белым пятном и кзади от него с еще одним беловатым пятном, кроме того большое беловатое пятно, обычно соединяющееся с первым, располагается вдоль наружного края ячеек. Жилки перепоночки желтоватые.

Низ тела темно-бурый до черного, покрывки средних тазиков и задний край площадки лахучих желез узко беловатые, такого же цвета вентральная часть шейного кольца. У ♀ иногда брюшко посередине светлое. Тазики темно-бурые или черные, вертлуги и бедра от грязно-желтых до почти черных. При светлых бедрах задние с 2 бурыми кольцами перед вершиной, на средних и передних 1 бурое кольцо и зачатки 2-го или бурых колец нет. Голенн желтоватые, с бурыми щетинками, выходящими из очень маленьких темных точек. 1-й и 2-й членики лапок желтоватые, 3-й — темно-бурый.