

σ 4—4.7, у φ 4.4—4.8 мм, а у *B. ulmicola* из того же места у σ 3.7, у φ 4—4.2 мм). Вырост чувствительного бугорка левого парамера короче и с 4—6 дольками на вершине (у *B. diaphanus* почти всегда с 3). Вершина правого парамера с рядом из 3—4 зубцов (у *B. diaphanus* клювовидная, с 2—3 налагающимися зубцами). Эдеагус меньше, чем у *B. diaphanus*, и со значительно более короткой спикулой.

Длина тела σ 3.1—4.2, φ 3.5—4.5, ширина σ 1—1.5, φ 1.1—1.6 мм (самые мелкие особи — в пустынных районах Восточно-Гобийского аймака МНР).

СССР. Амурская обл.: Благовещенск, 26 VI 1959 (Кержнер), 3 σ , том числе голотип, 1 φ . Хабаровский край: Хабаровск, 26 VII 1962 (Кулик), 1 σ , 2 φ . Приморский край: Спасск-Дальний, 17 VIII 1963 (Кержнер), 1 σ ; Уссурийск, 16 VII 1962 (Кулик), 1 σ , 9 φ ; Горно-Таежная станция ЮВ Уссурийска, 2 VIII 1963 (Кержнер), 1 σ , 2 φ .

Монголия. Центральный аймак: 40 км вост. Улан-Бато-ра, 3 VIII 1928 (Иванов), 17 экз. Восточный аймак: г. Дэрхин-Цаган-Обо, 60 км ВСВ Баян-Бурда, 21 VII 1971 (Кержнер), 41 экз.; р. Нуурэгин-Гол, 23 VII 1971 (Кержнер), 2 σ , 3 φ . Восточно-Гобийский аймак: 30 км ЮЮВ оз. Шохой-Нур, 4 VIII 1971 (Кержнер), 15 экз.; 25 км ЗСЗ оз. Тэнгэр-Нур, 25 VI и 5 VIII 1971 (Кержнер), 2 σ , 2 φ .

Живет на *Ulmus pumila*. Ближайший к новому виду *B. diaphanus* распространен через всю Палеарктику, на восток до Приморского края, живет на *Salix*.

Pilophorus validicornis Kerzhner, sp. n. (рис. 63).

Тело у σ в 2.8, у φ в 2.3 раза длиннее ширины, у σ с почти параллельными боками, у φ тело слегка расширено к задней трети надкрыльй. Голова очень коротко опушена, блестящая, черная или темно-бурая, темя у σ в 1.7, у φ в 2.1 раза шире глаза. 1-й членник усиков светло-желтый, суженный к основанию в базальной трети, покрыт черными прилегающими волосками. 2-й членник черный в вершинной части и темно-красно-бурый до желтого в базальных 2/3, булавовидный, наиболее толстый на расстоянии 1/8—1/10 от вершины, густо покрыт черными волосками, его толщина (с волосками) составляет 1/6—1/8 длины. 3-й и 4-й членники тонкие, покрыты светлыми волосками, 3-й и базальная половина 4-го белые, вершинная половина 4-го черная. Хоботок бурый, доходит до средних тазиков. Переднеспинка черная или темно-бурая, блестящая, с прямыми боковыми краями, в 2 раза шире своей длины, покрыта очень тонкими и короткими прижатыми волосками. Щиток черный, боковые края его с полосой густых серебристых чешуек. Надкрылья коричневые, весь экзокориум, вершина клавуса и кунеус блестящие и слегка более темные, покрыты короткими прижатыми черными волосками. Кориум с 2 поперечными полосами серебристых чешуек, задняя из них пересекает клавус без сдвига. Задний внутренний угол кориума и передний внутренний угол кунеуса с косой полоской серебристых чешуек. Ноги красные, очень коротко опушены, голени с черными щетинками. Низ тела темно-бурый. Задний край бочков средней и заднегруди с полосой серебристых чешуек. II—V стерниты брюшка с косым пятном серебристых чешуек.

Измерения (1 = 0.01 мм): ширина головы 92; ширина темени у σ 42, у φ 47; длина членников усиков, начиная с 1-го у σ 30, 150, 43, 50, у φ 30, 133, 35, 40; толщина 2-го членника (с волосками) у σ 18, у φ 20, ширина переднеспинки 120.

Длина тела σ 3.75, φ 3.5; ширина σ 1.35, φ 1.5 мм.